

Liraglutide

【ISAX】Saxenda® Inj. 18mg/3mL/ Pen

ATC Code : A10BJ02

中文名：善纖達注射液 «Novo Nordisk»

適應症：用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法。

藥理分類：Antidiabetic Agent, Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist.

用法用量： **Administration:**

1. **SubQ.** Do not inject intravenously or intramuscularly. Inject subcutaneously into the upper arm, thigh, or abdomen.
2. Change needle with each administration.
3. Administer on the same time daily, without regard to meals or time of day.
4. Once injected, continue to depress the button until the dial has returned to 0 **and** for an additional 6 seconds. Then, remove the needle.

Dosage regimen:

- ◆ **Initial**, 0.6 mg QD for 1 week; increase by 0.6 mg daily at weekly intervals to a target dose of 3 mg QD.
- ◆ If the patient cannot tolerate an increased dose during dose escalation, consider delaying dose escalation for 1 additional week.
- ◆ Efficacy has not been established at doses <3 mg/day; however, some experts will continue a patient on the maximum tolerated dose (even if <3 mg/day) if goal weight loss is achieved on that dose.

Note: Evaluate change in body weight after 12 weeks at maximum tolerated dose or 16 weeks after initiation of therapy; discontinue if at least 4% to 5% of baseline body weight loss has not been achieved

不良反應：噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、注射部位反應。

交互作用：

- FLUOROQUINOLONES : **increased** risk of **hypoglycemia or hyperglycemia**.
- HYDROXYCHLOROQUINE: **hypoglycemia**.
- BETA-ADRENERGIC BLOCKERS: **hypoglycemia or hyperglycemia**; decreased symptoms of hypoglycemia.
- FUROSEMIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE, INDAPAMIDE: **increased hyperglycemia** risk.
- ACE INHIBITORS : **increased** risk of **hypoglycemia**.

注意事項：

1. 禁用於個人或是家族有 MTC (甲狀腺髓質癌) 病史患者及第 2 型多發性內分泌腫瘤綜合症患者 (MEN2)。
2. 善纖達®為每日一次，可在一天中任何時間使用，無須隨用餐時間調整。注射在腹部、大腿或上臂，可改變注射部位和時間點，而不需調整劑量。但決定一天當中最方便的時間後，最好每天固定在大約相同的時間注射善纖達®。
3. 若錯過一劑且距延遲時間未超過 12 小時，應盡速用藥。若錯過一劑且距離下一劑注射時間不到 12 小時，請勿再補注射，應等到下一次用藥時間再注射，並恢復每日一次治療。

懷 孕 期：懷孕期間不應使用 liraglutide，如果想要懷孕或已懷孕，應停止 liraglutide。

授乳期：尚不清楚 liraglutide 是否會分泌到母乳。由於缺乏資料，哺乳期間不應使用。

儲存：1)未使用過的注射筆應儲存於 2-8°C 冷藏室，不可冷凍。2) 初次使用後：請存放於 30°C 以下或冰箱冷藏 (2°C 至 8°C)。請勿冷凍，也不要使用冷凍過的善纖達。3) 注射筆使用後必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

使用規定：目前屬自費品項。(2021/05)