

Levosimendan

【ISIMD】 Simdax® 12.5mg/5mL/Vial

ATC Code : C01CX08

中文名： 心得適濃縮注射劑 «ORION»

適應症： 短期治療因傳統治療方式無效且適用強心劑治療之急性失代償性慢性心衰竭。

藥理分類： Cardiac drugs, Inotropic Agent.

用法用量： **Administrations:**

Dilute the concentrate solution with D5W before IV infusion.

Dosage regimen:

Adults:

Initial 6-12 mcg/kg over 10 min followed by a continuous infusion of 0.05-0.2 mcg/kg/min, adjusted according to response.

Child, adolescent < 18 yrs, safety and efficacy not established.

不良反應： 頭痛、心室性心跳過速、低血壓。失眠、暈眩。噁心、便秘、腹瀉、嘔吐。

交互作用： 併用 Levosimendan 和其他靜脈注射心臟血管治療藥物時須小心使用，因為有增加低血壓的風險。

注意事項： 1. 本劑不建議使用於兒童和 18 歲以下之青少年。
2. 腎臟或肝臟功能障礙者謹慎使用。
3. 嚴重腎功能不全者不建議使用。

懷 孕 期： 無使用於孕婦的經驗。動物試驗結果顯示具生殖毒性。除非預期對孕婦的益處大於對胎兒可能的風險時方可使用。

授 乳 期： Levosimendan 是否會分泌至母乳中仍未知，大白鼠實驗已顯示 Levosimendan 會分泌至乳汁中，因此，接受 Levosimendan 治療的婦女不應授乳。

配 製： 1)將 5mL Simdax 注射液加入 500mL D5W，可得濃度為 0.025mg/mL 輸注液。
2)將 10mL Simdax 注射液加入 500mL D5W，可得濃度為 0.05mg/mL 輸注液。

相容輸注液： D5W。