

Triamcinolone Acetonide

【ISIV】Sivkort Suspension 10 mg/1 mL/Amp

ATC Code : A02AB08

中文名：修克托懸濁注射液 «壽元化學»

適應症：過敏性疾患、皮膚疾患、膠原病、結合織炎及關節炎。

藥理分類：Corticosteroid, Systemic.

用法用量：**Administration:**

- shake vial well before withdrawing medication; do not use if clumping occurs.
- inject immediately following withdrawal into syringe.
- inject deeply into gluteal muscle; use alternate sites for subsequent injections.
- use a minimum needle length of 1.5 inches; a longer needle may be necessary in obese patients.

Dosage regimens:

通常成人一週至一月一回之間隔注射於局部肌肉。

大關節 1 回 5-15mg，小關節、炎症周圍 1 回 1-10mg，必要時依副腎皮質 glucocorticoids 劑之全身療法併用。

不良反應：失眠、月亮臉、粉刺、多毛。

交互作用：1. Live attenuated human rotavirus vaccine(↑ risk of infection by the live vaccine).
2. Desmopressin (↑ risk of severe hyponatremia).
3. Fluoroquinolones(↑ risk of tendon rupture).

注意事項：1. 使用前應充分搖勻；抽取後應立即給藥，避免藥品沉著在針筒內。
2. 避免濫用，少量使用為宜，或行漸療法。
3. 如有感染症時，須同時併用抗生素或磺胺劑。
4. 發現有副作用(滿月樣顏貌、失眠、多毛、粉刺、骨多孔症等)時，應停藥。骨多孔症者，並用蛋白同化荷爾蒙劑。
5. 伴有高血壓者，應使用鹽類作用較少之藥(Methyl-prednisolone，Triamcinolone，Dexamethasone，Paramethasone，Betamethasone)。
6. 伴有糖尿病者，應使用劑量較低之藥(Dexamethasone，Betamethasone)
7. 伴有消化性潰瘍者或有其既往歷者，原則上勿用為宜，或與制酸劑、胃黏膜保護劑併用。
8. 禁忌：精神病，重疾精神神經症，活動性消化性潰瘍，抗生素無效之感染症。
9. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
10. 本藥品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥

懷孕期：若經評估需於懷孕期間使用，應採最低劑量及最短治療時間。

授乳期：若經評估需於懷孕期間使用，應謹慎使用。