

Monoammonium glycyrrhizinate

【ISNMC】SNMC (Stronger Neo-Minophagen C®) 0.65mg/mL, 20mL/Amp *ATC Code : B05BA*

中文名：新明發健注射液 «Minophagen»

適應症：維護肝臟正常功能、藥物過敏症、食物過敏。

成分：Each mL contains:

Monoammonium glycyrrhizinate 2.65 mg
(eq. to glycyrrhizin 2 mg)
Aminoacetic acid (JP) 20 mg
L-Cysteine hydrochloride 1 mg

藥理分類：Miscellaneous GI Drugs.

用法用量：Adults, IV 5-20 mL/day

Chronic hepatitis, IV or IV drip 40-60 mL/day, MAX 100 mL/day.

禁忌：Aldosteronism、myopathy 及 hypokalemia (會引起低鉀血症、高血壓症等之惡化) 患者禁用。

不良反應：低鉀血症、血壓上升、下肢浮腫、頭痛、熱感。

注意事項：

- 1.與 thiazides 及 loop diuretics 並用時，會加強本藥劑所含有之 glycyrrhizin 的鉀排泄作用，易造成低鉀血症。
- 2.本劑含有 glycyrrhizin，應注意勿重複使用含有甘草成分製劑。
- 3.臨床使用經驗證實，高齡者低鉀血症副作用發生率偏高，應謹慎投與。

懷 孕 期：懷孕婦女使用本品的安全性尚未建立。僅能在效益高於風險時才可用孕婦。動物試驗曾發現腎臟畸形。

授 乳 期：無安全性相關資料。

相容輸注液：D5W、NS、Amino acids。

備 註：本品為自費藥品。