

Insulin Glargine , Lixisenatide

【ISOLI】Soliqua® Inj. 3mL/ Pen

ATC Code : A10AE54

中文名： 爽胰達注射劑 «Sanofi»

適應症： 成人第二型糖尿病。

藥理分類： Antidiabetic Agent, Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist; Insulin, Long-Acting.

成分： Insulin Glargine----- 100unit/mL
Lixisenatide----- 50 μ g/mL

用法用量： **Administration:**

1. **SubQ.** Do not inject intravenously or intramuscularly. Inject subcutaneously into the upper arm, thigh, or abdomen.
2. When administering within the same body region, use a different injection site each week.
3. Administer within **one hour before** the first meal of the day, preferably the same meal each day.

Dosage regimen:

Initial:

Note: Discontinue therapy with basal insulin or a GLP-1 agonist prior to initiation of the combination product.

Patients currently on Insulin glargine (100 units/ml) $\geq 10 \sim < 20$ units:

10 Units of Dose ((10 units Insulin Glargine /5 μ g Lixisenatide)

Patients currently on Insulin glargine (100 units/ml) $\geq 20 \sim < 30$ units:

20 Units of Dose ((20 units Insulin Glargine /10 μ g Lixisenatide)

Maximum dose: insulin glargine 40 units, lixisenatide 20 μ g (**40 Units of Dose**)

Safety and efficacy not established in children < 18 yrs

不良反應： 低血糖、噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良。

注意事項：

1. **第一次使用前**，注射筆應先從冰箱取出置於室溫 1-2 小時。
2. Soliqua 不應與任何其他胰島素混合或稀釋。
3. 每個劑量單位(Dose Unit)含有 insulin glargine 1 unit 及 lixisenatide 0.5 μ g。
4. Soliqua 最高劑量可調整至 **40** 個劑量單位。當每日總劑量 >40 個劑量單位時，則不得使用本品。
5. Soliqua 100 units/mL + 50 μ g/mL 預填注射筆可提供 insulin glargine 10-40 units 合併 lixisenatide 5-20 μ g 之劑量單位。
6. 建議於餐前 1 小時內注射，每日一次。每日都固定在同一餐的餐前進行注射。Soliqua 應注射於腹部、上臂或大腿的皮下。
7. 只有在適當監測血糖的醫療監督下才能調整用藥劑量或給藥時間。

懷 孕 期： 1.目前尚無孕婦使用的足夠資料。動物試驗顯示 lixisenatide 具有生殖毒性。
2.Soliqua 不建議使用於有懷孕能力的未避孕婦女。Soliqua 不應在懷孕期間使用。若病人想要懷孕或已經懷孕，應停用 Soliqua。

授 乳 期： Insulin glargine 或 lixisenatide 是否會從人類乳汁中分泌仍不得而知。不可在哺乳期間使用。

- 儲存：
1. 未使用過(未開封)的注射筆:應儲存於冰箱 (2°C - 8°C)。
 2. 使用中(開封後)的注射筆:

儲存溫度	儲存天數
低於 25°C 之室溫。不可冷藏，不可冷凍	至多保存 28 天
低於 30°C 之室溫。不可冷藏，不可冷凍	至多保存 14 天