

【ISOO】 Soonmelt® 1.2g/Vial

ATC Code : J01CR02

中文名： 雙合黴素靜脈注射劑 《永信》

成分： Each vial contains:

Amoxicillin 1 g

Clavulanic Acid 0.2 g

藥理分類： **Antibiotic, Penicillin; Clavulanic acid: Beta-lactamases Inhibitor.**

用法用量： **Note:** Dosage strengths based on amoxicillin component.

Treatment should not be extended beyond 14 days without review.

Administration:

IV injection (3-4 minutes) or by **IV intermittent infusion** (over 30-40 minutes). It is not suitable for IM administration.

Dosage regimens:

— Adults and children over 12 years of age:

Usually 1 g 8 hourly. In more serious infections, increase frequency to 6-hourly intervals.

— Children 3 months to 12 years of age:

Usually 25 mg/kg 8 hourly. In more serious infections, increase frequency to 6-hourly intervals.

— Children 0-3 months of age:

25 mg/kg every 12 hours during the perinatal period, increasing to 8 hours thereafter.

不良反應： 腹瀉(最常見)、消化不良、噁心、嘔吐、紅斑疹、蕁麻疹等。

注意事項： 1.肝功能不全病人需小心使用。
2.腎臟功能不全病人需調整劑量。
3.本品含鈉，須注意血液電解質。

懷 孕 期： 臨床判斷益處大於風險時才於懷孕時投與此藥。

授 乳 期： 會有微量的藥物出現在乳汁，但除了會有感受度升高的危險之外，對以母乳餵哺的嬰兒並無任何不良影響。

配 製： 1.每一瓶先用 20ml 注射用水稀釋。泡製後 20 分鐘內，以 3~4 分鐘速率緩慢靜脈注射。或
2.立即以 NS 或 L.R 進一步稀釋後，以靜脈輸注 30~40 分鐘。應於稀釋後四小時內完成。

安 定 性： 1、Soonmelt® for IV Injection 在含有葡萄糖、聚葡萄糖或重碳酸鹽的輸注液中較不穩定。因此，配製後的 Soonmelt® 溶液不可加入這類輸注液中，但或可以 3-4 分鐘的時間緩慢注入滴管中。

2、Soonmelt® for IV injectoion 配製後，室溫保存 4 小時，2-8 °C 保存 8 小時。

用藥規定：全民健保藥品給付規定—限用於：

- 1、急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。
- 2、急性下呼吸道感染。
- 3、厭氧性細菌感染。
- 4、菌血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以 10 日為限。