

Glycyrrhizinic Acid, Glycine, L-cysteine

【ISORA】(自費) Soragen-S® Injection 20mL/Amp

ATC Code : A05BA08

主 成 分 : Each mL contains:

Glycyrrhizinic Acid.....5mg
Glycine.....20mg
L-cysteine.....1mg

中 文 名 : 治敏健注射液 «南光化學»

適 應 症 : 維護肝臟正常功能、藥物過敏、食物過敏。

藥理分類: **Miscellaneous GI Drugs**

用法用量:

Dosage regimens and Administration:

仿單:

- 成人: 1 日 1 次, 每次 5-20 mL 靜脈注射, 依年齡、症狀增減。
- 慢性肝病患者: 1 日 1 次, 每次 40-60 mL 靜脈注射或點滴靜注。
- 一日最大劑量: 100 mL。

廠商資料: 以 NS 或 D5W 250mL 稀釋後, 滴注 30~45 分鐘。

不良反應: 低血鉀(無力感、肌肉力量降低)、血壓上升、體重增加(鈉、體液滯留)、皮疹。

交互作用: 若同時使用 **thiazide 類**或 **Loop 類**利尿劑, 應注意觀察, 因可能 glycyrrhizin 加強排鉀作用而造成低血鉀。

注意事項:

- Aldosteronism 症患者、Myopathy 患者、低血鉀患者, 不建議使用。
- 投與後應保持患者安靜, 並小心觀察。
- 休克情形罕見, 故給藥後應小心觀察, 若有異常即應停藥。
- 高齡者較易發生低血鉀, 用於此類病人應謹慎。

懷 孕 期: Scientific evidence for the safe use of Soragen-S® during pregnancy is not available.

授 乳 期: Scientific evidence for the safe use of Soragen-S® during lactation is not available.

儲 存: 於 25°C 以下陰涼處存放。