

Ixekizumab

【ITAL】 Taltz® 80mg/1mL/pen

ATC Code : L04AC13

中文名：達癬治注射劑 «ELI LILLY»

適應症：1.斑塊性乾癬。2.乾癬性關節炎。3.僵直性脊椎炎。4.無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎。

藥理分類：Anti-interleukin 17A Monoclonal Antibody; Antipsoriatic Agent; Monoclonal Antibody.

用法用量：給藥方式：皮下注射方式給藥。

適應症與劑量：

成人斑塊性乾癬：

第 0 週給予 160 mg (兩劑 80mg 的注射劑)，接著於第 2、4、6、8、10 與 12 週投予 80 mg，之後每 4 週投予 80 mg。

兒童斑塊性乾癬：

6~18 歲兒童建議劑量與給藥方式

體重	起始劑量(第 0 週)	此後每 4 週(Q4W)投予
大於 50 公斤	160mg	80mg
20~50 公斤	80mg	40mg
小於 25 公斤	40mg	20mg

乾癬性關節炎：

- 建議劑量為第 0 週以皮下注射方式給予 160 mg (兩劑 80 mg 的注射劑)，隨後每 4 週投予 80mg。
- 同時患有中度至重度斑塊性乾癬之乾癬性關節炎病人，應採用斑塊性乾癬的建議劑量。
- TALTZ 可單獨使用或與傳統疾病調節抗風濕藥物(cDMARD) (例如：methotrexate)合併使用。

僵直性脊椎炎：

- 建議每 4 週投予 80mg。
- 曾經對於至少一種 TNF 抑制劑反應不佳或無法耐受的病人，可以考慮在第 0 週給予 160 mg (兩劑 80 mg 的注射劑)，隨後每 4 週投予 80mg。
- TALTZ 治療期間可繼續給予 cDMARD (例如：sulfasalazine)、皮質類固醇、非皮質類固醇抗發炎藥(NSAID)和/或止痛劑。

無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎：

建議每 4 週給予 80mg。

不良反應：可能會引起注射部位局部反應、感染、頭痛、噁心等。

交互作用：● LIVE VACCINES: **increased** risk of infection by the live vaccine.

- 注意事項：
1. 就醫時或施打疫苗前，請告知您的醫療人員您正在使用本藥。
 2. 開始 TALTZ 治療前，應考慮依據現行疫苗接種指南完成適合各年齡的疫苗接種。接受 TALTZ 治療的病患應避免使用活性疫苗。目前未有對於活性疫苗反應的資料。
 3. 因在使用本藥後有較高機會受到感染，所以請您經常洗手，並避免接近受到

感染或感冒的人。

4. 本品為筆型注射劑，供皮下注射使用。

5. 注射部位：腹部(勿注射於肚臍周遭 1 吋內)、大腿、手臂背面。注射部位須輪流。

6. 請勿搓揉注射部位。

懷 孕 期：目前並無懷孕婦女使用 TALTZ 的資料可用於說明藥物的相關風險。

授 乳 期：目前未有關於 ixekizumab 是否會分泌於人類乳汁中、對於哺乳嬰兒之作用或對於乳汁分泌的影響之資料。

儲 存：避光(置於原包裝盒內)儲存於 2-8°C。必要時，於 30°C 以下室溫，可保存 5 天。自冰箱取出置於室溫後，請勿再放回冰箱，並於 5 天內用畢。

備 註：限初次使用本藥劑之患者方給予 Enbrel 專用冰保袋，以供冰存攜回。冰保袋遺失者或治療中斷恢復療程者，皆不予補發 Enbrel 專用冰保袋。