

Tramadol HCl

【ITRAM】 Tramtor Injection 100mg/2mL/Amp

ATC Code : N02AX02

中文名： 頓痛特注射液 «美時化學»

適應症： 嚴重之急慢性疼痛。

藥理分類： Analgesic, Opioid.

用法用量： Safety and efficacy not established in children < 12 yr.

1. Tramtor Injection:

IV: 1~2mL (50-100mg--slowly or given after diluted with SWFI)

IM: 1~2mL (50-100mg)

SWFI :sterile water for injection

SubQ: 1~2mL (50-100mg)

MAX dose, 400 mg/day

不良反應： 噁心、眩暈、嘔吐、口乾舌燥、發汗、虛弱等。

交互作用：

- MAOIs: ↑ risk of serotonin syndrome or opioid toxicity.
- Cimetidine, mirabegron, fluoxetine, paroxetine, sertraline, duloxetine: ↑ tramadol exposure.
- Lithium: ↑ risk of serotonin syndrome.
- Clopidogrel: ↓ efficacy of clopidogrel.
- CYP3A4 **inducers** (phenytoin, dexamethasone, rifampin, prednisone, rifabutin, rifapentine): ↓ traMADol exposure.
- Serotonergic cyp3a4 **inducers** (carbamazepine, st john's wort): ↑ risk of serotonin syndrome and ↓ tramadol plasma concentrations.
- Donepezil: ↓ seizure threshold.
- Diphenhydramine, prochlorperazine, chlorpromazine: ↑ risk of paralytic ileus; ↑ risk of respiratory and CNS depression.

注意事項：

- 1.供肌肉、靜脈、皮下注射或靜脈輸注。
- 2.若欲以靜脈途徑給藥，請注意緩慢給藥(每分鐘注射 Tramadol Injection 1 毫升，相當於 50 毫克 Tramadol HCl)或用溶液稀釋後再注射。
- 3.服用 SSRI、MAOI(14 天內)、抗精神分裂症藥物及其它三環化合物或鴉片或其它會降低癲癇發作閾值的藥物的病人，併用本劑會增加癲癇發作的危險性。
- 4.報告指出曾有病人在服用 tramadol 建議劑量下發生**痙攣**。當 tramadol HCl 的劑量超過每日最高劑量上限(400mg)時，這種危險性可能會增加。
- 5.(1)應謹慎使用於未滿 12 歲兒童，當臨床效益大於風險時，方可考慮使用。
(2)應謹慎使用於未滿 18 歲之扁桃腺及腺樣體切除術後止痛。
(3)應謹慎使用於肥胖、具有阻塞型睡眠呼吸中止症、嚴重肺部疾病等情形之病人，因可能增加嚴重呼吸問題之風險。

懷 孕 期： Tramadol 不應被使用於懷孕的婦女身上。Tramadol 會透過胎盤。懷孕期間長期使用可能會造成新生兒戒斷症候群。動物研究顯示 tramadol 在非常高的劑量下會影響器官發展、骨化和新生兒死亡率。

授 乳 期： 用藥期間不建議哺乳，因可能對哺餵之嬰兒產生嚴重不良反應，包括：異常嗜睡、哺乳困難或嚴重呼吸問題。