

Atosiban Acetate

【ITRAT】Tractocile® concentrate for sol. for inf. 37.5mg/5mL/Vial ATC Code : G02CX01

中文名：孕保寧濃縮輸注液 «Ferring»

適應症：延遲妊娠婦女迫切的早產。

用法用量：Dosage and administration:

靜脈給予 Tractocile® 分為三個階段：

- 初始以 Tractocile® 7.5 mg/ml 注射劑靜脈推注 6.75 毫克劑量；
- 隨後立即給予 3 小時持續的大劑量輸注 Tractocile® 7.5 mg/ml 輸注用濃縮液(負荷劑量滴注 300 微克/分鐘)；
- 續以小劑量輸注 Tractocile® 7.5 mg/ml 濃縮輸注液(後續劑量滴注 100 微克/分鐘)，最長持續 45 小時。
- 治療時間不能超過 48 小時，整個療程 Tractocile® 的總劑量最好不要超過 330 毫克(以 atosiban 計)。如果在 Tractocile® 治療期間，子宮仍持續收縮，應考慮其他替代療法。

下表顯示靜脈推注隨後立即給予輸注的劑量：

階段	給藥方式	速率	劑量
1	0.9 毫升靜脈注射	超過 1 分鐘	6.75 毫克
2	3 小時靜脈滴注	24 毫升/小時	18 毫克/小時
3	靜脈滴注	8 毫升/小時	6 毫克/小時

在產房有足夠的醫療監視下給予負荷劑量滴注每小時 24 毫升，相當於每小時 18 毫克，持續 3 小時。3 小時後降為每小時 8 毫升。

注射液 以相容之輸注液稀釋：

配製：在 100 毫升輸液袋中準備藥物溶液時，從輸液袋中抽取 10 毫升液體棄掉，再抽取 10 毫升 7.5 毫克/毫升 Tractocile® 輸注用濃縮液(兩個 5 毫升小瓶) 注入其中，這樣 100 毫升液體中就含有 75 毫克 Tractocile®。

相容之輸注液 0.9% (w/v) 等張生理鹽水、林格氏乳酸溶液、5% (w/v) 等張葡萄糖溶液

不良反應：噁心、血糖升高、頭痛、頭暈、心跳過速、低血壓 潮紅、注射部位反應

交互作用：體外試驗顯示 atosiban 不是 Cytochrome P450 系統的受質，而且也不會抑制代謝藥物的 Cytochrome P450 的酵素。

注意事項：● 本品為濃縮輸注液：一旦開啟，必須立即稀釋。

● 供靜脈輸注之溶液稀釋後應在 24 小時內使用。

懷孕期：Atosiban 只能用於懷孕週數在 24-33 週妊娠婦女的早產。

哺乳期：在 atosiban 臨床試驗中，沒有觀察到對哺乳的影響。已經證明少量 atosiban 從哺乳婦女的血漿進入乳汁中。