

Dulaglutide

【ITRU】 Trulicity® Inj. 1.5mg/0.5mL/Single Dose Pen

ATC Code : A10BJ05

中文名：易週糖注射液 «臺灣禮來»

適應症：第 2 型糖尿病。

藥理分類：Antidiabetic Agent, Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist.

用法用量：**Administration:** SubQ.

1. Inject subcutaneously into the upper arm, thigh, or abdomen. **Do not** inject intravenously or intramuscularly.
2. When administering within the same body region, use a different injection site each week.
3. Administer once weekly on the same day each week, without regard to meals or time of day.

Dosage regimen:

Initiate: 0.75 mg QW. The dose may be increased to 1.5 mg once weekly for additional glycemic control.

The Max dose: 1.5 mg QW.

Safety and efficacy not established in children < 18 yrs

不良反應：噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良。

交互作用：

- **Hydroxychloroquine** : hypoglycemia.
- **Beta blockers**: hypoglycemia or hyperglycemia; **decreased** symptoms of hypoglycemia.
- **Furosemide**, hydrochlorothiazide, indapamide: ↑ hyperglycemia risk; ↑ insulin requirement.
- **ACE inhibitors**: ↑ risk of hypoglycemia.

注意事項：1. 禁用於個人或是家族有 MTC（甲狀腺髓質癌）病史患者及第 2 型多發性內分泌腫瘤綜合症患者（MEN2）。
2. 有胰臟炎病史的病患，應考慮使用其他降血糖藥物。
3. Trulicity®預填充注射器是拋棄式，僅供單次使用，一週給藥一次；若有需要，可以改變每週給藥的日子，但前後兩劑之間隔必須為 3 日以上。
4. 若錯過一劑，且距離下一次預定給藥時間至少 3 日(72 小時)，則應儘快使用。若距離下次預定給藥時間未滿 3 日，則應跳過錯過的劑量，於原本預定的日期給予下一次劑量。上述兩種情況下，均可恢復原本每週一次的給藥時程。

懷 孕 期：懷孕婦女使用 Trulicity®的數據有限。依據動物生殖試驗，在懷孕期間暴露於 dulaglutide 可能對胎兒有風險。只有當潛在益處高過對胎兒的潛在風險時，才可在懷孕期間使用。

授 乳 期：目前並不清楚 Trulicity®是否會分泌到人類乳汁中。由於許多藥物會被分泌到人類乳汁，且 Trulicity®可能對授乳嬰兒引起臨床不良反應的潛在風險，應衡量 Trulicity®對母親的重要性，決定是否停止授乳或停用 Trulicity®。

儲 存：Trulicity®應該儲存於 2 - 8 °C 冷藏室；若有需要，可保存於室溫下，不超過 30 °C，為期至多 14 日。必須避光保存，建議置於原包裝盒中保存。