

Varicella-Zoster virus(Oka/Merck)

【IZOS】自費 Zostavax[®] 0.65mL/Syringe

ATC Code : J07BK02

中文名：伏帶疹活性帶狀疱疹疫苗 «MSD»

適應症：預防 50~79 歲之成人帶狀疱疹。

藥理分類：Vaccine; Vaccine, Live (Viral).

用法用量：Administration:

- SUBcutaneous injection only.
- To prevent syncope related injuries, patients should be vaccinated while **seated or lying down** (ACIP [Kroger 2021]).

Dosage regimen:

Shingles prevention:

Manufacturer labeling: Adults ≥ 50 years:

SubQ: 0.65 mL administered as a single dose.

ACIP recommendation: Adults ≥ 60 years:

SubQ: 0.65 mL administered as a single dose; there are no data to support re-administration of the vaccine. (CDC/ACIP [Harpaz, 2008])

不良反應：噁心、皮疹、關節痛、肌痛、頭痛、投藥部位紅斑、酸痛、腫脹。

注意事項：1.泡製後應立即皮下注射。若未在 30 分鐘內使用，即應予以拋棄。
2.建議病人注射時應坐或躺，以避免因暈厥造成傷害。
3.接種 Zostavax[®]疫苗後應避孕 3 個月。

懷 孕 期：Zostavax[®]不可施用於孕婦。不確知對孕婦施打 Zostavax[®]是否會造成胎兒傷害。不過，已知自然發生的水痘帶狀疱疹病毒(VZV)感染有時會造成胎兒傷害。因此，Zostavax[®]不可施用於孕婦。

授 乳 期：目前並不確知水痘帶狀疱疹病毒(VZV)是否會排入人類的乳汁。由於有些病毒會排入人類的乳汁，因此，對授乳婦女施打 Zostavax[®]時應謹慎。

儲 存：1.Zostavax[®]應冷藏貯存於 2 至 8 °C 或更低的溫度下，直到準備泡製成注射液再取出。稀釋液應另外貯存於室溫下(20 至 25 °C)或冰箱中(2 至 8 °C)。在泡製之前應避免光線照射。
2.泡製後若未在 30 分鐘內使用，即應予以拋棄。泡製後的疫苗切勿冷凍。