

Dimethylpolysiloxane (Simethicone)

【O2GASCL】Wilcon<sup>®</sup> 20mg/mL 300mL/bot

ATC Code : A03AX13

中文名：胃爾康懸浮液 «聯邦化學»

適應症：解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

藥理分類：**Antiflatulent.**

作用機轉：Decreases the surface tension of gas bubbles thereby disperses and prevents gas pockets in the GI system.

用法用量：**Administration:** Orally, shake well before using; may mix with 30 mL water or other liquids.

**Indications and Dosage regimens:**

1. 腹部膨滿感及鼓腸：通常成人一次 2ml(40mg)，一日三次，飯後或飯間服用。
2. 胃照相機胃鏡檢查時驅除胃內氣體：於攝影前 15-40 分前，通常大人 1~2ml (20mg-40mg)與 10ml 水同時服用。
3. X 光攝影時驅除腸內氣體：攝影 3 至 4 天前一次，2~4ml (40mg-80mg)，一日三次飯後或飯間服用。

不良反應：軟便，腸胃不適，腹瀉，腹痛，嘔吐，胃部重壓感，食慾不振。

- 注意事項：
1. 建議飯後或飯間服用。
  2. 使用前，充分振搖均勻。使用後瓶蓋栓緊。
  3. 本劑在體內不被吸收，非腸道亢奮劑且非吸著劑，無便秘作用，具有適度的緩下作用。
  4. Not to exceed a maximum daily dose of 500 mg/day. (*UpToDate, 2020*)

懷 孕 期：Simethicone is **not absorbed** systemically following oral administration. Systemic absorption would be required in order for simethicone to cross the placenta and reach the fetus (Mahadevan 2006).

授 乳 期：Due to lack of systemic absorption, simethicone is **not** expected to be excreted in breast milk (Hagemann 1998).

備 註：僅備於胃鏡支氣管室使用，門診藥局及住院藥局均無備存。