

Magnesium Carbonate, Citric Acid

【O2MAG】Magvac® Oral Solution 250 mL/Bot

ATC Code : A06AD10

中文名： 鎂福內服液 《瑞安》

適應症： 緩瀉劑

成分： 每 1 mL 含：
Magnesium Carbonate42.857mg
Citric Acid72.286 mg

藥理分類： **Laxative, Saline; Magnesium Salt.**

- 用法用量：
1. 腸胃道清腸時的使用方式：
 - (1)檢查前一天晚上整瓶服用(250mL)，並需與刺激性瀉劑搭配使用，才能達到最佳藥效。詳細步驟請依照醫師指示使用。
 - (2)藥品服用後需補充大量水分，以達到排空的效果，並預防因清腸可能造成的脫水現象。
 2. 便秘之急性治療：

睡前 20~50mL。口服後需補充水分，以達到排空的效果。

不良反應： 腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛。

- 注意事項：
1. 嚴重腎功能不佳者禁止使用。
 2. 請照醫師指示服用。
 3. 口服後需補充水份，以達到排空效果。

懷 孕 期： Magnesium crosses the placenta; serum concentrations in the fetus are similar to those in the mother (Idama 1998; Osada 2002).

授 乳 期： Magnesium is found in breast milk; concentrations remain constant during the first year of lactation and are not influenced by dietary intake under normal conditions.