

Barium Sulfate

【O3BARI】Baritop LV 300mL/Bot

ATC Code : V08BA02

中文名： 鋇脫普液-120 《台灣希比希》

適應症： 食道、胃、十二指腸雙重顯像攝影

藥理分類： Radiopaque Agents

用法用量： 成分：每 100g 中含有硫酸鋇 99.5g

配製：本劑每 100g 中加入 18~26mL 的水，製成 200~240w/v% 濃度的懸濁液體。

用法：經口投與。

濃度調製	添加水	全量
約 200%	82mL	149mL
約 210%	75mL	142mL
約 220%	68mL	135mL
約 230%	63mL	130mL
約 240%	57mL	124mL

成人劑量：

檢查部位	檢查方法	用量(mL)
食道	雙重顯像	30~ 50
胃・十二指腸	雙重顯像	200~230

不良反應： 排便困難、便秘、暫時性腹瀉或腹痛、肛門部位疼痛或出血、噁心嘔吐、發疹、搔癢感、蕁麻疹。

- 禁忌：
- (1) 已知或疑似消化道穿孔之患者。
 - (2) 已知胃腸道阻塞之患者。
 - (3) 胃腸穿孔高風險，如最近胃腸穿孔、急性胃腸出血或缺血、毒性巨結腸症嚴重腸阻塞、胃腸手術或切片後、急性胃腸損傷或燒傷或最近骨盆腔或攝護腺放射治療。
 - (4) 吸入高風險，如過去曾吸入、氣管食道瘻管、或意識不清。
 - (5) 對硫酸鋇製劑或賦形劑有嚴重過敏之患者。

- 注意事項：
1. 有心臟疾病之高齡患者，曾出現產生心律不整、心電圖異常之狀況，需留意觀察。
 2. 硫酸鋇停留在消化道內，極少數病例會引發消化道穿孔、腸阻塞、大腸潰瘍、大腸炎、憩室炎、鋇劑闌尾炎等症狀，尤其是高齡者嚴重時可能導致病危等結果，請留意。
 3. 投給後的處置：為了防止排便困難或便秘，檢查後必須攝取水分、瀉藥投給等處置。

懷孕期： 對懷孕中投給有關的安全性未得確立。其次由於投給本劑時連帶有 X 光照射關係，對孕婦或可能已懷孕之患者，則限於診斷上的效益大於危險性時才投給。

哺乳期： 經口服的硫酸鋇不會被吸收，而經消化器官由糞便排出體外。預期不會出現於乳汁。