

## Abiraterone Acetate

【O8065】 Zytiga® Tab 250mg

ATC Code : L02BX03

中文名：澤珂錠 250 毫克 « Patheon INC. »

適應症：治療攝護腺癌。

藥理分類：Antiandrogen, Antineoplastic Agent.

用法用量：Administration:

- Orally, administer **on an empty stomach**, at least 1 hour before or 2 hours after food. No food should be consumed for at least 2 hours before or for at least 1 hour after the abiraterone (Zytiga) dose.
- Swallow tablets whole with water. Do not crush or chew.

### Indications and Dosage regimens:

#### Prostate cancer, metastatic, castration-resistant:

1,000 mg QD (in combination with prednisone or prednisolone 5 mg BID)

#### Prostate cancer, metastatic, high-risk, castration-sensitive:

1,000 mg QD (in combination with prednisone or prednisolone 5 mg QD)

**Missed doses:** If a dose is missed, skip the missed dose and take the next dose at the next scheduled time; do not double the next dose.

不良反應：乳房觸痛、男性女乳症、熱潮紅、腹瀉、噁心、黃疸（肝功能變化）、虛弱、搔癢等。

交互作用：Phenytoin, carbamazepine, rifampin, rifabutin, rifapentine, phenobarbital: ↓ the serum concentration of Abiraterone Acetate.

**Management:** *Avoid whenever possible. If such a combination cannot be avoided, increase abiraterone acetate dosing frequency from once daily to **twice daily** during concomitant use.*

注意事項：1. 空腹(飯前 1 小時或飯後 2 小時)服用。應整顆以水送服。勿壓碎或嚼碎。  
2. 與某些藥物(如 phenytoin、 carbamazepine、 rifampin、 rifabutin、 rifapentine、 phenobarbital)之間可能發生交互作用，而影響藥效。

懷孕期：1. ZYTIGA®用於女性的安全性與療效尚未確立。根據其作用機制與動物試驗的發現，孕婦投予 ZYTIGA®會造成胎兒傷害，並可能導致流產。  
2. Abiraterone may cause fetal harm or fetal loss if administered during pregnancy. Abiraterone is not indicated for use in females.

授乳期：1. ZYTIGA®用於女性的安全性與療效尚未確立。目前並無關於 abiraterone acetate 是否會出現於人類的乳汁中、對餵哺母乳之嬰兒的影響、或對乳汁生成作用之影響等方面的資料。  
2. It is not known if abiraterone is present in breast milk. Abiraterone is not indicated for use in females.

健保規定：  
(摘要) ● 治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)、藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)、藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌，須經事前審查。  
● 治療 mCSPC 時，與 apalutamide、enzalutamide 僅能擇一使用。  
● 治療 mCRPC 時，與 enzalutamide 僅能擇一使用。(111/3/1)