

Isoniazid, Rifapentine

【O8068】 Isoniazid, Rifapentine 300mg_300mg/Tab

ATC Code : J04AB05

中文名： «疾管局»

適應症： 結核病

藥理分類： **Antitubercular Agent.**

用法用量： **Administration:** orally, administer **with meals**. For patients who cannot swallow tablets, the tablets may be crushed and added to a small amount of semi-solid food and consumed immediately.

Dosage regimen:

Tuberculosis, latent infection:

Once-weekly regimen:

PO: Administer for 12 weeks.

Note: Should be administered by DOT(directly observed therapy).

>50 kg: 3 Tablets once weekly for 12 weeks.

不良反應： 腹瀉、腹痛、頭暈、噁心或嘔吐。尿液、皮膚與人體分泌物呈橘紅色。

交互作用： Voriconazole: ↓ plasma voriconazole level and ↑ plasma Rifapentine level.

Exemestane : ↓ exemestane exposure.

Clarithromycin: ↓ clarithromycin exposure and ↑ risk of uveitis; ↑ Rifapentine exposure.

Fluconazole: ↑ Rifapentine serum level and potential Rifapentine toxicity.

Dronedarone: ↓ dronedarone plasma level.

Fentanyl: ↓ plasma concentrations of fentanyl.

Indinavir: ↓ indinavir efficacy.

Nifedipine: ↓ nifedipine exposure.

注意事項： 1.限於 50 公斤以上病患使用。

2.若有皮膚過敏或皮膚變黃，應儘快告訴醫師。服藥期間會使淚液、尿液或糞便變成橘色。服藥期間不要配戴隱形眼鏡。

懷孕期： 沒有對懷孕婦女進行適當且有良好控制的研究。只有在可能的效益超過對胎兒可能造成的風險時方可使用。

授乳期： 沒有對授乳婦女進行適當且有良好控制的研究。只有考慮對母體的重要性後，才決定要停止補乳或停止用藥。乳汁可能變橘紅色。