

Molnupiravir

【O8072】公費 Molnupiravir 200mg/ cap

ATC Code : J05

中文名： Molnupiravir « Merck»

適應症： 治療 COVID-19。

藥理分類： **Antiviral Agent.**

用法用量： **Administration:**

Oral: Administer with or without food. Swallow capsules whole; do not open, break, or crush.

Indications and dosage regimens:

COVID-19, treatment, mild to moderate (outpatients with high risk of progression to severe illness):

— Adult & Adolescents ≥ 18 years:
800 mg BID x 5 days.

Dosing: Kidney Impairment; Hepatic Impairment:

No dosage adjustment necessary.

不良反應： 腹瀉、噁心、暈眩。

注意事項：

1. 空腹或與食物一起服用皆可。整粒吞服，不可打開膠囊、磨碎或咀嚼。
2. 忘記服藥：如果距原訂服藥時間在 10 小時內，請儘快補服；若距原訂服藥時間已經超過 10 小時，就不必補服。接下來按照原訂服藥時間、方法服藥，直到完成治療(服用完所有藥錠)，切記不可補服兩倍劑量。
3. 本藥物並未被核准用於 18 歲以下的病人，因可能影響骨骼與軟骨的生長。
4. 最適宜儲放溫度為 30°C 以下。

懷 孕 期：

- 動物生殖研究的結果，對孕婦投予本藥物可能會對胎兒造成傷害。
- 不建議於懷孕期間使用本藥物。
- 具生育能力的病人胎兒可能面臨的風險，並且在使用本藥物治療期間和使用最後一劑藥物後 4 天內應正確並持續採取可靠的避孕措施。

授 乳 期：

- 目前並無任何關於 molnupiravir 或其代謝物是否會出現於人類的乳汁方面的資料。
- 由於嬰兒可能會對 molnupiravir 產生不良反應，因此，在使用 molnupiravir 治療期間和使用最後一劑藥物後 4 天內不建議餵哺母乳。

使用規定： 具任一重症風險因子(除懷孕外)，未使用氧氣且於發病 5 天內之 ≥ 18 歲病人，且無法使用其他建議藥物者。

※風險因子包括：年齡 ≥ 65 歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性

肝炎)、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症、吸菸(或已戒菸者)、BMI \geq 30(或12-17歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位)、影響免疫功能之疾病(HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)。

備註：目前本藥尚未取得我國藥物上市許可，係因應緊急公共衛生需要，專案核予EUA (emergency use authorization) 以提供病人使用。