

Acemetacin

【OACEM】Acemet[®] 60mg/Cap

ATC Code : M01AB11

中文名： 艾斯美特膠囊 «健喬信元»

適應症： 風濕性關節炎、退化性關節炎（骨關節炎）、僵直性脊椎炎、痛風、肌肉炎、腱鞘炎、滑囊炎。

藥理分類： Analgesic, Nonopioid; Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID).

用法用量： Adults, 60 to 120 mg QD-TID.

不良反應： 頭痛、嗜眠、胃腸不適、消化性潰瘍、眩暈、血球減少、耳鳴。

注意事項：

1. 曾對 acetylsalicylic acid 或 indomethacin 過敏者禁用。
2. 本品會經由肝臟轉換為 Indomethacin。
3. 14 歲以下的小孩、孕婦（特別是懷孕前 3 個月）應避免使用，除非絕對需要。
4. 餐中服用或飯後立即服用。
5. 如用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀,宜立即就醫並考慮停藥。
6. 如果出現眩暈，請勿駕駛車輛或操作危險器械，酒精會加強眩暈作用。
7. 心血管栓塞事件：
 - (1) NSAIDs 藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品的時間越長，風險越大。
 - (2) 進行冠狀動脈繞道手術 (CABG) 之後 14 天內禁用本藥。

懷孕期： 孕婦（特別是懷孕前 3 個月）應避免使用，除非絕對需要。

授乳期： 本品用於授乳婦時，其對嬰兒的安全性尚未確立。