

Der. pte. extract, Der. far. extract

【OACR】Acarizax® 12 SQ-HDM Oral Lyophilisate

ATC Code : V01AA03

中文名：阿克立舌下錠 12 SQ-HDM «Abbott»

適應症：治療成人及青少年(12-65 歲) 因塵蟎引起之過敏性鼻炎。

藥理分類：Allergenic Extracts. (Acarizax® 是一種過敏免疫療法。)

成分說明：**Der. pte. extract**：歐洲室塵蟎 (*Dermatophagoides pteronyssinus*) 萃取液

Der. far. extract：美洲室塵蟎 (*Dermatophagoides farina*) 萃取液

含量說明：1. 每一粒舌下錠中含有 12 **SQ-HDM***的標準化過敏原萃取液，此萃取液乃由歐洲室塵蟎與美洲室塵蟎提煉而得。

* SQ-HDM 是阿克立舌下錠的劑量單位。**SQ** 一種制定生物效價、主要過敏原含量以及過敏原萃取液的標準化方法。**HDM** 則是室塵蟎的英文(house dust mite)縮寫。

用法用量：1. 成年及青少年 (12-65 歲) 病人建議劑量為每日一錠 (12 SQ-HDM)。
2. 目前阿克立舌下錠**不得使用**在小於 12 歲的兒科病人。
3. 目前阿克立舌下錠**不得使用**在大於 65 歲的老年病人。

不良反應：鼻咽炎、支氣管炎、味覺障礙、眼睛癢、耳朵癢、喉嚨有異物感、消化不良。

藥物特性：阿克立舌下錠是一種**凍晶口服錠**。

注意事項：1. 建議第一次口服劑量應在醫療院所內服用，服用後留院觀察至少半小時。

2. 打開包裝後，應立即用**乾手指**將口服錠放入舌下使其崩解。

3. **大約 1 分鐘後才可以吞下**。接下來 5 分鐘內不可以吃東西或喝飲料。

4. 有嚴重**口腔發炎**(例如：口腔扁平苔癬、口腔潰瘍或鵝口瘡)、口腔傷口或剛動完口腔手術如拔牙或掉牙等情形時，應延後開始阿克立舌下錠的治療，若為已經在使用阿克立舌下錠的病人，則應暫停用藥，直到口腔傷口痊癒。

懷孕期：1. 目前尚未有懷孕婦女使用阿克立舌下錠的臨床資料。

2. 懷孕期間不應使用阿克立舌下錠。

3. 若在阿克立舌下錠治療期間懷孕，可經由評估病人身體狀況(包含肺功能)以及病人先前使用阿克立舌下錠的反應情況，而決定是否繼續用藥。

授乳期：1. 目前尚未有在阿克立舌下錠治療期間授乳的臨床資料。

2. 預期授乳嬰兒可不受阿克立舌下錠的影響。