

Rifampin 150mg, Isoniazid 75mg, Pyrazinamide 400mg, Ethambutol 275mg

【OAKU4】 AkuriT-4[®] Tablets

ATC Code : J04AM06

中文名：立剋核-4 膜衣錠 «微確藥品»

適應症：結核病。

成分：Each tab contains:

Rifampin U.S.P. 150 mg
Isoniazid U.S.P. 75 mg
Pyrazinamide U.S.P. 400 mg
Ethambutol Hydrochloride U.S.P. 275 mg

藥理分類：Antitubercular Agent.

用法用量：口服。於餐食 1 小時前或餐後 2 小時服用。

成人：AkuriT-4 的服用劑量是基於病患的體重。

病患體重 (Kg)	持續治療期 每日服用 AkuriT-4 顆數
30-37	2
38-54	3
55-70	4
≥ 71	5*

* ≥ 71 Kg 的用法用量，宜參見我國疾病管制局結核病診治指引，依國內疾病管制局建議，每日最大劑量為 Isoniazid 300 mg 及 Rifampin 600 mg。

不良反應：頭暈、尿酸升高、肝指數異常、視力異常、末梢神經症狀、臉潮紅、關節痛。

注意事項：1. **空腹服用**(餐前一小時或餐後二小時)。
2. 服藥期間避免飲酒
3. 服藥後體液可能變成橘紅色，避免戴隱形眼鏡。
4. 使用期間須定期監測肝功能。

懷 孕 期：臨床評估需考量對孕婦的益處及對胎兒的潛在風險。

授 乳 期：須評估對哺乳婦的益處及對胎兒的潛在風險，以決定停止用藥或停止哺乳。

儲 存：25 °C 以下，避潮。