

Fexofenadine HCl

【OALLE】 Allegra® 60mg/Tab

ATC Code : R06AX26

【OALLEG】 Allegra® 180mg/Tab

ATC Code : R06AX26

中文名：艾來錠劑 «Sanofi»

適應症：緩解成人及 6 歲以上兒童的季節性過敏性鼻炎及慢性自發性蕁麻疹相關症狀。

藥性簡述：Active carboxylic acid metabolite of terfenadine.

藥理分類：Histamine H₁ Antagonist, Second Generation.

用法用量：Administratiaon : orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimen :

Upper respiratory allergies, Chronic idiopathic urticaria :

Adults & Children ≥ 12 yr: 60 mg BID or 180 mg QD

6-11 yr: 30 ~60mg BID.

Special Populations – Renal Impairment:

Adults & Children ≥ 12 yr: 60mg QD.

Children 6-11 yr: 30 mg QD.

不良反應：頭痛、疲倦、口乾、排尿困難、便秘、心跳快速、背痛。

注意事項：
1. 飯前或飯後服用均可。
2. 勿併服含酒精飲料。
3. 服用此藥後，勿駕車或操作危險器械。
4. 不可在服用含鋁及鎂的制酸劑後 15 分鐘內投與。

交互作用：
1. Fexofenadine 與 erythromycin 或 ketoconazole 並用仍會導致 fexofenadine 的血中濃度升高，而 fexofenadine 對 erythromycin 及 ketoconazole 的藥物動力學則無任何影響。
2. 在服用含鋁及鎂的制酸劑後 15 分鐘內投與 120 mg fexofenadine HCl，會減少 41% AUC 及 43% 最高血中濃度。

懷 孕 期：並無任何適當且控制良好的孕婦研究。只有在潛在效益超越對胎兒的潛在危險性時，才可在懷孕期間使用。

授 乳 期：
1. Fexofenadine 是否會分泌於人類的乳汁中，目前尚不清楚。對授乳期間的婦女，並無任何適當且控制良好的研究。由於許多藥物都會分泌進入人類的乳汁中，因此，對授乳婦女投予 Allegra® 時應謹慎。
2. If a breastfed infant is exposed to a second generation antihistamine via breast milk, they should be monitored for irritability, jitteriness, or drowsiness.

過量處置：
1. Fexofenadine HCl 過量的報告並不常見，且其中的資訊極為有限。萬一過量時，應考慮採取標準處置措施，以移除任何未吸收之藥物，並建議採取症狀性及支持性療法。
2. 在投與 terfenadine 之後，血液透析並不能有效地將 fexofenadine 自血液中移除（最多只能移除 1.7%）。