

Glimepiride

【OAMAR】Amaryl® 2mg/Tab

ATC Code : A10BB12

中文名：瑪爾胰 «Sanofi»

適應症：非胰島素依賴型（第2型）糖尿病。

藥理分類：Sulfonylurea, Antidiabetic Agent.

用法用量：Safety and effectiveness not established in children.

Administratiaon : Orally, take with breakfast or the first main meal.

Dosage regimens :

Initially: 1-2 mg QD, increase by less than 2 mg/day at 1-2 week intervals.

Maintenance: 1-4 mg QD;

MAX dose: 8 mg/day.

不良反應：低血糖症、短暫性視力障礙、胃腸不適、肝臟酵素增高。

- 注意事項：
- 1.嚴重性腎或肝功能異常患者，懷孕及授乳婦禁用本劑。
 - 2.接受 glimepiride 治療期間，必須定期做肝臟及血液學檢查（尤其是白血球及血小板）。
 - 3.早餐前立即服用或隨餐服用。若未進食早餐，則應於每日的第一餐正餐前立即服用。
 - 4.避免大量飲酒(因酒會延長低血糖作用)。

懷 孕 期：懷孕期間應禁用 glimepiride，否則會有傷害胎兒的風險，懷孕患者應改用胰島素。

授 乳 期：Glimepiride 是否會經由人類的乳汁排除尚不得而知。因為其他的 sulfonylureas 會排除於人類乳汁，為避免可能從母乳攝取到而傷害嬰兒，授乳期間應禁用 glimepiride。若有必要，患者需改用胰島素治療或停止授乳。