

Anastrozole

【OANAZ】Anazo<sup>®</sup> 1mg/Tab

ATC Code : L02BG03

中文名：安納柔膜衣錠 «台灣東洋»

適應症：1.輔助治療停經後婦女早期侵犯性乳癌，其雌激素接受器為陽性，且有血栓栓塞症或子宮內膜異常增生的高危險群，而無法使用 Tamoxifen 的治療者。  
2.停經後雌激素接受器為陽性或不清楚之局部晚期或轉移性乳癌第一線治療。  
3.停經後婦女晚期乳癌，雌激素接受器陰性，曾經對 Tamoxifen 有陽性反應者。

藥理分類：Aromatase Inhibitor, Antineoplastic Agent.

用法用量：Administration: Orally, may be administered with or without food.

**Dosage regimens:**

**Breast cancer:**

— **First-line Treatment of Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer:**

1 mg QD. Continue therapy until tumor progresses.

— **Second-line Treatment of Advanced Breast Cancer:**

1 mg QD. Continue therapy until tumor progresses.

— **Adjuvant Treatment of Early Breast Cancer:**

1mg QD. Optimum duration unknown; ongoing clinical study designed for 5 year treatment period.

不良反應：熱潮紅(≥ 10%)、噁心、腹瀉、關節疼痛/僵硬、無力、頭痛等。

注意事項：1.請每日同一時間服藥。飯前或飯後服用均可。  
2.輕度或中度腎功能不良病患，不建議調整劑量。  
3.有輕度肝病者，不建議調整劑量。中度或嚴重肝病者，禁止使用。

交互作用：1.含有 estrogens 的療法不可與 anastrozole 併用，因會抵消 anastrozole 之作用。  
2.Tamoxifen 不應與 anastrozole 並用，因會降低 anastrozole 之血漿濃度。

懷孕期：禁用。

授乳期：禁用。