

## Prednisolone Sodium Phosphate

【OANTF】 Kidsolone® Oral Solution 1mg/mL, 60mL/Bot      *ATC Code : H02AB06*

中文名： 必爾生口服液 «晟德»

適應症： 風濕性關節炎、支氣管氣喘、潰瘍性結腸炎、過敏性疾病。

成分： Each mL contains:

Prednisolone Sodium Phosphate ..... 1.344 mg  
(equivalent to Prednisolone base 1 mg)

藥理分類： **Corticosteroid, Systemic.**

用法用量： **Administration:** orally taken with meals.

### **Dosage regimens:**

#### **Adults:**

—Usual Dosage

Initially, 5-60 mg/day, depending on the disease being treated; usually administered in 2-4 divided doses.

—Acute Exacerbations of Multiple Sclerosis

200 mg/day for 1 week, followed by 80 mg every other day for a month.

#### **Children:**

Initially, 0.14-2 mg/kg/day or 4-60 mg/m<sup>2</sup>/day in 3 or 4 divided doses.

不良反應： 腸胃不適，情緒變化，食欲增加，水腫，肌肉痛，視力模糊，骨質疏鬆，毛髮增加等。

禁忌： 全身性黴菌感染（補充腎上腺皮質功能不全者除外）或對本成分過敏者。

注意事項： 1. 與食物一起服用可以減輕腸胃副作用。若每日服用一次，建議於早上服用。  
2. 不可自行突然中斷治療。  
3. 糖尿病患者使用時，請注意增加 INSULIN 之用量。  
4. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

懷 孕 期： 1. 許多動物實驗顯示給予母體與人類等效劑量之 prednisolone 時，會造成胎兒畸形。在給予懷孕小鼠、大鼠及兔子 prednisolone 動物實驗中的後代均有較高顎裂的發生率。  
2. 目前於懷孕婦女尚無適當且控制良好的研究試驗；因此，唯有在 prednisolone sodium phosphate 的潛在效益大於對胎兒可能造成的危害時，才可於懷孕過程中使用。  
3. 母體於孕期服用 corticosteroids 所生之嬰兒需小心觀察及檢查是否有腎上腺功能不足的現象。

授 乳 期： Corticosteroids 會分泌至人類乳汁，也會抑制成長、干擾內生性 corticosteroids 的產生，或造成其他不希望的作用。本藥需謹慎地用於授乳婦女。

給付規定： 全民健保藥品給付規定—內服液劑之使用原則：

1、12 歲(含)以下兒童得使用內服液劑。

2、施行管灌飲食等不適合服用錠劑之病人，得依病情需要使用內服液劑。