

Mifepristone

【OAPA】(RU-486) (Apano[®]) 200mg/Tab

ATC Code : G03XB01

中文名：保諾錠 《美時化學》

適應症：懷孕前期（小於七週）子宮內孕之人工流產。

藥理分類：Abortifacient; Antiprogesterin; Cortisol Receptor Blocker.

用法用量：**Administration:** orally, as a single dose without regard to meals.

Dosage regimens:

- Mifepristone 600 mg as a single dose is indicated for the medical termination of intrauterine pregnancy through 49 days' pregnancy.
- Two days after mifepristone, misoprostol (e.g. Cytotec[®]) 400 mcg is administered.

不良反應：子宮出血、頭痛、噁心、嘔吐、下痢、腹痛。

禁忌：慢性腎上腺衰竭、長期並用類固醇類治療、出血性疾病或並用抗凝血治療、尚未經由超音波掃描或生化測驗確認的懷孕、妊娠日數已超過 49 天、疑似子宮外孕、因前列腺素藥物而產生的禁忌、35 歲以上婦女且一天抽菸超過 10 支以上、遺傳性紫質沉著病。

交互作用：Mifepristone is a strong CYP3A4 Inhibitors.

- 若與 Mifepristone 併用，下列藥品血中濃度會上升，應避免併用：Triazolam、Ticagrelor、Tamsulosin、Simvastatin、Red Yeast Rice、Lovastatin、Lercanidipine、Fluticasone (Nasal)、Dronedarone、Domperidone、Aprepitant、ALPRAZolam、Alfuzosin、Dihydroergotamine、Ergonovine、Ergotamine、Methylegonovine、Methysergide。
- 若與下列藥品併用，Mifepristone 的血中濃度會下降，應避免併用：Carbamazepine, Phenytoin, Rifampin, St. John's wort。
- Grapefruit Juice: ↑ the serum concentration of Mifepristone, avoid combination.
- **Corticosteroids** (Systemic): ↓ therapeutic effect of Corticosteroids, avoid combination.

注意事項：1. 患者第一次口服 600 mg 的 mifepristone，在服用 misoprostol 與服用後 3 小時內，患者必須留在醫療院所內觀察。
2. 服用 mifepristone 36-48 小時後，回診使用前列腺素 misoprostol 400mcg。
2. 服用 mifepristone，2 週後還要回診，以確定妊娠組織是否完全排出。
3. 使用本藥品後，應追蹤出血狀況（該出血可能引起細菌感染無發燒症狀之敗血症。）並注意噁心、嘔吐、下痢、虛弱與腹痛等副作用。

懷 孕 期：1. 在這類藥物墮胎的失敗案例中，有可能會繼續懷孕，因此胎兒就有產生畸形的危險。如果本法失敗，則必須在下次的追蹤訪視時，以其他方法來終止妊娠。（仿單）
2. Mifepristone is contraindicated for use in pregnant women when used to control hyperglycemia in Cushing syndrome.

授 乳 期：1. 保諾錠可能會經由母親乳汁排出。所以建議授乳婦女服用保諾錠後停止授乳 3-4 天。（仿單）
2. Mifepristone is present in breast milk. (UpToDate, 2020)

備 註：本品健保不給付。