

Etoricoxib

【OARCO】Arcoxia® 60mg/Tab

ATC Code : M01AH05

中文名：萬克適錠 «MSD»

【OARCX】Etocoxii® F.C. Tablets 60mg

ATC Code : M01AH05

中文名：骨適添樂膜衣錠 60 毫克 «中國化學»

適應症：骨關節炎（OA）與類風濕關節炎（RA）之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛。

藥理分類：Analgesic, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID), COX-2 Selective.

用法用量：Administration: Orally, may be taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

The dose for each indication is the maximum recommended dose.

Osteoarthritis: 60 mg QD

Rheumatoid Arthritis: 90 mg QD

Acute Gouty Arthritis / Primary Dysmenorrhea:

120 mg QD. 120 mg should be used only for the acute symptomatic period, limited to a maximum of 8 days treatment.

Special Populations:

Child-Pugh 5-6, MAX 60mg/day;

Child-Pugh 7-9, MAX 60 mg/2day.

Safety and efficacy not established in pediatric patients.

不良反應：虛弱無力、疲倦、眩暈、下肢水腫、高血壓、消化不良、胃灼熱、噁心、頭痛、ALT 升高、AST 升高。

交互作用：

- SNRI(如 venlafaxine, duloxetine): ↑ risk of bleeding.
- Ketorolac: ↑ GI adverse effects (peptic ulcers, GI bleeding and/or perforation).
- TCA(如 imipramine, amitriptyline, doxepin): ↑ risk of bleeding.
- SSRI(如 fluoxetine, paroxetine, sertraline, escitalopram): May result in an increased risk of bleeding.
- Tenofovir disoproxil fumarate: ↑ risk of acute renal failure.
- Furosemide, Thiazides: ↓ diuretic effectiveness and possible nephrotoxicity.
- Enoxaparin, ginkgo: ↑ risk of bleeding.
- Lithium: ↑ lithium exposure and risk of lithium toxicity.
- Potassium-sparing diuretics(如 spironolactone, amiloride): ↓ diuretic effectiveness, hyperkalemia, or possible nephrotoxicity.

禁忌：

1. 已知患有缺血性心臟疾病、週邊動脈疾病和/或腦血管疾病(包括最近做過冠狀動脈繞道手術或血管修復手術)。
2. 進行冠狀動脈繞道手術(CABG) 之後 14 天內禁用本藥。
3. 血壓持續高於 140/90 mmHg 且無法有效控制之高血壓病人。

注意事項：

1. 空腹或與食物一起服用皆可。
2. 用藥後如發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀，宜立即就醫。

懷孕期：

1. 在懷孕後期應避免使用 Etoricoxib，因為可能會導致動脈導管過早閉鎖。
2. 只有在潛在效益確定超越對胎兒的潛在危險時，才可於懷孕的最初六個月期間使用。

哺乳期：

目前尚不確知本藥是否會分泌進入人類的乳汁。而且餵哺母乳的嬰兒可能會因本藥抑制前列腺素合成而產生副作用，應謹慎考慮本藥對母親的重要性，並據以決定要停止餵哺母乳或是停用本藥。