

Leflunomide

【OARH】 Arheuma® 20mg/Tab

ATC Code : L04AA13

中文名： 雅努麻錠 «美時化學»

適應症： 1.治療成人類風濕性關節炎，並可能減緩類風濕病程對關節所造成之結構性損害（即屬於 DMARD disease modifying antirheumatic drug）。
2.治療具活動性的成人乾癬性關節炎。

藥理分類： Antirheumatic, Disease Modifying.

用法用量 **Administration:** orally, without regard to meals. Swallow the tablet whole with enough water.

Indications and dosage regimen:

Loading dose:100 mg QD for 3 days,

Maintenance dose:

Rheumatoid arthritis: 10-20 mg QD.

Active psoriatic arthritis: 20mg QD

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應： 可能會引起高血壓，胃腸不適，皮膚疹，掉髮或肝功能指數上升等。

注意事項： 1.飯前或飯後服用皆可。整粒吞服並請喝足夠量的冷開水。
2.開始用 Leflunomide 治療之前應排除懷孕的可能；懷孕婦女，或 Leflunomide 治療期間未使用有效避孕方法之可能懷孕的婦女，其後只要 Leflunomide 活性代謝物之血漿濃度高於 0.02 mg/L 不可懷孕。
3.可能懷孕的婦女，停藥後必須經過 2 年的等待期才可懷孕，且等待期過後，第一次檢測 Leflunomide 活性代謝物血漿濃度，至少間隔 14 天後必須再測，如果 2 次血漿濃度皆低於 0.02 mg/L，則無胎兒畸型之危險。如果有效避孕且長達 2 年的等待期不實際，則可能需要施行藥物排除步驟來預防。
※藥物排除步驟：停止 Leflunomide 治療後
Cholestyramine 8 g，一天 3 次，服用 11 天；或 activated charcoal 50 g，一天 4 次，服用 11 天。
4.男性病患應注意可能有男性引起的胎兒毒性，服藥期間應使用有效的避孕方法。

懷 孕 期： 禁止使用。可能懷孕的婦女，停藥後必須經過 2 年的等待期才可懷孕。

授 乳 期： 服用 Leflunomide 治療的婦女不可以授乳。