

Donepezil HCl

【OARID】 Aricept® Evess 10mg Orodispersible Tablets

ATC Code : N06DA02

中文名：愛憶欣口崩錠 10 毫克 《衛采製藥》

適應症：阿茲海默症

藥理分類：Acetylcholinesterase Inhibitor (Central)

用法用量：**Administration:** allow tablet to dissolve completely on tongue and follow with water.

Dosage regimens:

Alzheimer disease:

Mild to moderate:

Initial: 5 mg QD;

may increase to 10 mg once daily after 4 to 6 weeks.

Moderate to severe:

Initial: 5 mg QD;

may increase to 10 mg once daily after 4 to 6 weeks;

不良反應：噁心、腹瀉、失眠、嘔吐、倦怠與食慾減退。

注意事項：1.可單獨服用或與食物一起服用。
2.依照醫師指示服用或於晚間服用。
3.將藥錠放置於舌頭上，待其崩散後，再用水配服。

懷孕期：1. 尚無充足或控制良好之研究。懷孕婦女僅能在治療效益高於對胎兒之危險性時才可以服用本藥。

2. Adverse events have been observed in some animal reproduction studies.

授乳期：是否會被分泌至人體乳汁中尚未知悉，授乳婦女服用 Aricept 時應小心。