

Mesalazine(Mesalamine)

【OASA8】 Asacol® 800mg/Tab gastro-resistant tablets

ATC Code : A07EC02

中文名： 阿腸克錠 800 毫克 «科懋»

適應症： 治療潰瘍性結腸炎及其持續治療以防止復發。

藥理分類： 5-Aminosalicylic Acid Derivative

用法用量： **Administration: orally, take before meals.**

Indications and dosage regimens:

Ulcerative Colitis:

— Initial:

PO: 800~1600 mg TID.

— Maintenance of remission:

PO: 800 mg BID

Crohn's Disease:

PO: 800 mg TID~QID.

Safety and efficacy not established in children.

不良反應： 腹痛、胃脹氣、噁心、腹瀉；頭痛、眩暈、口乾等。

交互作用： Mercaptopurine, NSAIDs

注意事項： 1.嚴重腎損害者(GER < 20 mL/min)及 2 歲以下孩童禁用。
2.本劑為腸溶錠，必須整粒吞服，不可嚼碎或剝半，最好於飯前服用，以確保藥效。
3.勿與制酸劑一併服用。
4.本品不能與 lactulose 及其類似品同時應用，以免因糞便之 pH 值降低而妨礙 mesalazine 錠劑中之釋出。

懷 孕 期： 1.應僅限於醫師判斷治療需要性大於可能發生之風險，且應謹慎使用。
2.Dibutyl phthalate (DBP) may be an inactive ingredient in the enteric coating of some products (eg, Asacol, Asacol HD).
3.When treatment for inflammatory bowel disease is needed during pregnancy, mesalamine may be used, although products with DBP should be avoided (Habal 2012; Mottet 2009; van der Woude 2015).

授 乳 期： 1. 治療中會有少量之 mesalazine 會排至乳汁。哺乳期間使用 mesalazine 應判斷治療需要性大於可能發生之風險。
2. Treatment with mesalamine is considered to be acceptable while breastfeeding (Habal 2012; Mottet 2009; van der Woude 2015).