

Ketotifen

【OATHS】Athmin<sup>®</sup> Syrup 0.2mg/mL, 60mL/Bot *ATC Code : R06AX17*

中文名：喘敏糖漿 «晟德»

適應症：支氣管氣喘、過敏性支氣管炎。

成分： Each mL contains:  
Ketotifen fumarate ..... 0.276 mg  
(eq. to Ketotifen ..... 0.2 mg)

【OZADT】Defen<sup>®</sup> 1mg/Cap *ATC Code : R06AX17*

中文名：祛喘膠囊 «瑞安»

適應症：支氣管性氣喘、變態反應性支氣管炎、乾草熱引起之哮喘、變態反應性鼻炎、變態反應性皮膚反應。

藥理分類：**Histamine H1 Antagonist, Second Generation; Mast Cell Stabilizer.**

用法用量：**Administration:** Administer without regards to meals.

**Dosage regimens:**

**Adults:**

1-2 mg BID; MAX. 4 mg/day.

If drowsiness is likely to be a problem, initially, 0.5-1 mg at night.

**Children:**

—6 mo - 3 yr: 0.5 mg BID (0.25mL/kg BID)

—> 3 yr: 1 mg BID (5mL BID)

不良反應：鎮靜、口渴、嗜睡、暈眩。

注意事項：  
1. 飯前或飯後服用均可。  
2. 勿併服含酒精飲料。  
3. 服用此藥後，勿駕車或操作危險器械。  
4. 喘敏糖漿含阿斯巴甜，苯酮尿症患者不宜使用本藥品。

懷孕期：並無任何適當且控制良好的孕婦研究。只有在潛在效益超越對胎兒的潛在危險性時，才可在懷孕期間使用。

授乳期：尚未知 ketotifen 是否會分泌至人類乳汁中，故接受本品治療時，應停止哺乳。

使用規定：全民健保藥品給付規定—

一、內服液劑之使用原則：

1. 12 歲(含)以下兒童得使用內服液劑。
2. 施行管灌飲食等不適合服用錠劑之病人，得依病情需要使用內服液劑。

二、Ketotifen

Montelukast sodium (如 Singulair Coated Tab, Singulair Chewable Tabs, Singulair Chewable Tab, 4mg、Singulair oral granules 4mg)不得與 cromoglycate 或 ketotifen 併用。