

Dutasteride

【OAVO】 Avodart® Soft Cap 0.5mg/Cap

ATC Code : G04CB02

中文名： 適尿通軟膠囊 «GSK»

適應症： 良性前列腺增生。

藥理分類： 5 Alpha-Reductase Inhibitor

用法用量： **Administration:** orally, without regard to meals. Swallow whole, do not chew or open the capsule.

Dosage regimen:

0.5 mg orally once daily.

Note:

A therapeutic trial of at least 6 months may be necessary to assess whether a beneficial response has been achieved.

不良反應： 乳房腫痛、乳房異常、勃起異常、射精異常、性慾降低。

交互作用：

- Clarithromycin：↑ exposure of Dutasteride and risk for toxicity.

注意事項：

1. 懷孕或可能懷孕之婦女須禁止暴露或接觸本品，因會造成男性胎兒之外生殖器異常。
2. 膠囊需整顆吞服，切勿嚼食或將膠囊打開；直接接觸膠囊內容物可能會對口咽部黏膜造成刺激。
3. 禁用於婦女及兒童。
4. Dutasteride 可經由皮膚吸收，因此婦女及小孩應避免接觸到裂損的膠囊，因為可能因此而吸收 Dutasteride，而且對男性胎兒可能造成胎兒異常的危險。若接觸到裂損的膠囊，應立即以肥皂及水清洗接觸處。
5. 服用 Avodart®在治療 3 個月之後，血清 PSA 總濃度約少 40%，在治療 6 個月之後，攝護腺肥大的病人其 PSA 值約降低為治療前的 50%。
6. Dutasteride 經由人類 cytochrome P450 酵素 CYP3A4 所代謝。因此，當 CYP3A4 酵素抑制劑存在時，dutasteride 在血液中的濃度會增加。

懷 孕 期：

1. Dutasteride 禁用於婦女。若懷孕婦女暴露在 dutasteride 下，其體內血中之 dihydrotestosterone 量受到抑制，將可能因而抑制男性胎兒外生殖器之發育。
2. Pregnant women are advised to avoid contact with crushed or broken tablets and the semen from a male partner exposed to dutasteride.

授 乳 期： Avodart®不適用於哺乳婦女，尚未得知 dutasteride 是否會分泌至人類乳汁中。