

Bambuterol HCl

【OBAMB】Bambec (Baburo[®]) 10mg/Tab

ATC Code : R03CC12

中文名：喘平樂錠 «信東»

適應症：支氣管氣喘。

藥理分類：Beta₂-Adrenergic Agonist

用法用量：**Administration:** orally, take without regard to meals.

Dosage regimen:

Adults and Adolescents:

Initial: 10 mg QD;

may increase to 20 mg QD after 1 to 2 weeks if needed.

Children 6 to 12 years:

Initial: 5 mg QD,

Maximum dose:10 mg daily.

Children 2 to <6 years:

5 mg QD.

不良反應：震顫，頭痛，強直性肌肉痙攣、心悸。

交互作用：1.會延長 succinylcholine 之肌肉鬆弛作用。
2.β-Adrenergic blocking agents 可能會部分或完全抑制本劑之作用。

注意事項：1.飯前或飯後服用均可。
2.β₂-agonists 具升高血糖作用，糖尿病患開始使用本劑應注意血糖控制。
3.肝硬化及嚴重肝功能不全患者，以直接投與其活性代謝物 terbutaline 為佳。
4.因 terbutaline 主由腎臟排除，對於腎功能不良（GFR ≤ 50 mL/min）患者，投與劑量應減半。
5. Bambuterol 會代謝為 Terbutaline，而 Terbutaline 具緩解子宮縮收作用。

懷 孕 期：動物試驗未發現有致畸胎作用，但懷孕期間使用本品需小心，尤其是前三個月。

授 乳 期：尚未確知 bambuterol 或其中間代謝物是否會進入乳汁中。Terbutaline 會進入乳汁中，但對幼兒之影響遠小於治療劑量。