Picosulfate, Citric acid, Magnesium Oxide

【OBOW】 Bowklean[®] Powder, 16.2g/Sachet, 2 Sachets/盒

ATC Code : A06AB58

中文名：保可淨散劑 《天義》

適應症：成人大腸鏡檢查前之清腸劑

主成分：Each sachet contains:

picosulfate sodium---10 mg, magnesium oxide---3.5 g, citric acid anhydrous---12 g

藥理分類：Cathartic; Laxative, Bowel Evacuant.

用法用量：1. Bowklean[®] Powder 產品為散劑，必須在臨用前以常溫冷水泡製。

2. 產品共含兩劑，需於不同時間服用。

3. 建議以「分次用藥」方式服用（依照醫師指示）

(1) 第一劑：大腸鏡檢查前一晚服用

(2) 第二劑：隔天進行大腸鏡檢查前的早上服用

4. 兩劑服用完畢後均需額外補充澄清流質飲品（勿食用固態食物或飲用牛奶）

不良反應：噁心、頭痛、嘔吐、頭暈、腹痛

交互作用：1. 會造成體液或電解質變化而提高風險的藥物

2. 開始服藥後 1 小時內服用的口服藥品：可能會影響正常吸收

3. 抗生素：先前或同時服用之抗生素可能會影響 Bowklean[®] Powder 的療效

注意事項：1. 每次使用前將本藥溶於約 150 毫升的常溫冷水中。2. 如服用第一劑後發生嚴重脹氣、腹脹或腹痛時，必須等到症狀緩解後再服用第二劑。3. 服藥後至睡前，每 20-30 分鐘補充 250 毫升水份至少 6-8 次以上。

懷孕期：除非確有需求，否則懷孕期間不可使用 Bowklean[®] Powder

授乳期：目前還不清楚本品是否會分泌至人類的乳汁中。由於許多藥物都會分泌進入人乳，為哺乳中的婦女處方 Bowklean[®] Powder 時應特別小心。

禁忌：1. 腎功能嚴重下降（肌酸酐廓清率小於 30 mL/分鐘）禁用

2. 胃腸道阻塞或腸阻塞

3. 腸穿孔

4. 中毒性大腸炎或中毒性巨結腸症