

Hyoscyamine Sulfate

【OB UW】Buwecon® 0.125mg/Tab

ATC Code : A03BA03

中文名： 薪保賜康錠 《永信》

適應症： 下列疾患之痙攣及運動機能亢進、胃潰瘍、胃酸分泌過多、內臟痙攣、痙攣性結腸炎、膀胱炎、幽門痙攣、妊娠嘔吐、腎痙攣、膽痙攣、痛經。

藥理分類： Anticholinergic Agent.

用法用量： **Administration:**

1. Administer hyoscyamine orally or sublingually, without regard to meals.
2. Antacids may interfere with absorption, administer hyoscyamine orally or sublingually before meals and antacids after meals.

Dosage regimen:

Adults:

0.125 to 0.25 mg every 4 hours or as needed; MAX 1.5 mg/day.

Children (2-12 yr):

0.0625 to 0.125 mg every 4 hrs or as needed. MAX 0.75 mg/day

不良反應： 口乾鼻塞、頭暈、視覺模糊、排尿困難、噁心、便秘等。

注意事項： 1. **可吞服亦可舌下使用**。飯前或飯後服用均可。
2. 避免從事開車等伴有危險性的機械操作。
3. 勿使用於青光眼、尿路阻塞、腸胃道阻塞患者。
4. 含有阿斯巴甜(aspartame)，苯酮尿患者不宜使用。

懷 孕 期： 只有在益處高於潛在風險時才使用本藥於孕婦。

授 乳 期： 本品會分泌於乳汁中，授乳婦應謹慎使用。