

Caduet 5/20 (Amlodipine, Atorvastatin)

【OCADU】Caduet® 5/20Tablet

ATC Code : C10BX03

中文名： 脂脈優 «Pfizer»

適應症： 因有高血壓和血脂異常這兩種可矯正的危險因子併存，而使心血管危險增加的患者；或因有心絞痛為表現之冠心病（CHD）併有可矯正的血脂異常危險因子，而使心血管危險增加的患者。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙、或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)前曾經發生冠心病事件，適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。

成分： Each tablet contains:

Amlodipine 5 mg, Atorvastatin 20 mg

藥理分類： Calcium Channel Blocker, Dihydropyridine: Antianginal Agent; Antihypertensive; HMG-CoA Reductase Inhibitor: Antilipemic Agent.

用法用量： **Note:** Dose is individualized; combination product may be substituted for individual components in patients currently maintained on both agents separately or in patients not adequately controlled with monotherapy (using one of the agents or an agent within same pharmacologic class).

Administration: orally, taken with or without food.

Indications and dosage regimens:

Hypertension, angina, and hyperlipidemia: Oral:

Initial: Amlodipine 5 mg and atorvastatin 10-20 mg once daily; dose may be titrated after 1-2 weeks (amlodipine component) and after 2-4 weeks (atorvastatin component) to a **maximum** daily dose: Amlodipine 10 mg; atorvastatin 80 mg

Add-on therapy/replacement therapy: Amlodipine 5-10 mg and atorvastatin 10-80 mg once daily; dose may be titrated after 1-2 weeks (amlodipine component) and after 2-4 weeks (atorvastatin component) to a **maximum daily dose:** Amlodipine 10 mg; atorvastatin 80 mg.

禁忌： Amlodipine/atorvastatin 禁用於下列患者：

- 1.有活動性肝病或不明原因的血清氨基轉移酵素持續上升超過正常值上限 (ULN) 3 倍以上之患者。
- 2.孕婦、授乳婦或有生育能力而未確實避孕的婦女。

交互作用： 1.本品若與azole類抗黴菌劑、cyclosporine、fibric acid衍生物、erythromycin或niacin並用，則會增加發生肌病的危險性。

2.應避免與紅麴類食品並用(紅麴(monascus)含有天然的 statin)，以免體內 statin 含量過高，影響肝功能。

3.葡萄柚或葡萄柚汁： amlodipine 生物可用率可能會增高，而使用降血壓作用增強。使用期間不建議大量飲用葡萄柚汁。

4. Verapamil、Amiodarone： Verapamil 與 amiodarone 都已知會抑制 CYP3A4 的活性，與 atorvastatin 合併投予可能會導致 atorvastatin 的曝藥量升高。

5. Rifampicin、St John's Wort：併用可能會導致 amlodipine 的血中濃度降低。

不良反應： 水腫、便秘/腹瀉、消化不良、頭暈。關節痛、肌痛、關節腫脹。

注意事項： 1.飯前或飯後服用皆可。2.不可與葡萄柚汁併服。3.不要與紅麴類食品併用。

懷孕期： 禁用。

授乳期： 禁用。