

Terbinafine HCl

【OCAM】Camisan<sup>®</sup> 250mg/Tab

ATC Code : D01BA02

中文名：克黴先錠 250 公絲 «信東生技»

適應症：甲癬(onychomycosis)、髮癬(tinea capitis)，嚴重且廣泛且經局部治療無效的皮膚黴菌感染。

藥理分類：Antifungal Agent, Oral.

用法用量：Administration : orally, taken without regard to meals.

**Indications and dosage regimen :**

**Onychomycosis:**

— **Fingernails:**

250 mg daily given for 6 weeks.

Fingernails infections usually are reevaluated  $\geq$  18 weeks after completion of treatment.

— **Toenails:**

250 mg daily given for 12 weeks.

Some patients who do not respond to the initial 12-week regimen may respond to a second course. Toenails infections usually are reevaluated 6-9 months after completion of therapy.

**Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis & cutaneous candidiasis :**

125 mg BID or 250 mg QD up to 6 weeks.

Safety and efficacy not established in children < 18 yrs

不良反應：胃腸不適、紅疹、味覺異常、肝指數上升。

交互作用：

- Warfarin：可能會增加出血的危險性，應密切監測 prothrombin time。
- Rifampicin：會提高本劑之血漿廓清率，因而降低本劑之治療反應。
- DOXOrubicin (Conventional): ↑ DOXOrubicin 血中濃度，避免併用。

注意事項：1. 兒童、肝機能障礙患者及 Clcr 小於 50mL/min 者，不建議使用。  
2. 飯前或飯後服用均可。

懷 孕 期：懷孕者使用療黴舒的臨床經驗很少，因此建議懷孕婦女不要使用，除非使用本品可能的好處大於可能的危險性。

授 乳 期：Terbinafine 可能出現在乳汁中，口服使用本品者不可授乳。

使用規定：全民健保給付規範：Terbinafine (如 Lamisil<sup>®</sup> Tablet) 限

1、手指甲癬及足趾甲癬病例使用，每日 250 mg，手指甲癬限用 42 顆，需於 8 週內使用完畢。足趾甲癬限用 84 顆，需於 16 週內使用完畢。治療結束日起算，各在 6 及 12 個月內不得重複使用本品或其他同類口服藥品。

2、其他頑固性體癬及股癬病例使用，每日一次，最長使用 2 週，治療期間不得併用其他同類藥品。

3、頭癬病例使用，每日一次，最長使用 4 週，若確需延長治療時間，需於病歷詳細載明備查。

