

## Carvedilol

【ODILT6】 Dilatrend® 6.25mg/Tab

ATC Code : C07AG02

中文名： 達利全錠 «Roche»

適應症： 鬱血性心臟衰竭。

【OCARV】 Carvedilol Tablets 25mg/Tab

ATC Code : C07AG02

中文名： 壓落保錠 25 毫克 «中化裕民»

適應症： 高血壓、鬱血性心臟衰竭。

藥理分類： Beta-Blocker with Alpha-Blocking Activity.

用法用量： **Administration:** with food to decrease the risk of orthostatic hypotension.

### Indications and dosage regimen:

#### Hypertension:

Initial, 12.5 mg QD; titration, dose may be doubled every 1-2 weeks;  
MAX dose, 25 mg BID or 50mg QD.

#### Congestive heart failure:

Initial, 3.125 mg BID for 2 weeks; titration, dose may be doubled every 2 weeks to highest dose tolerated.

MAX dose, 25 mg BID (BW ≤ 85 kg) and 50 mg BID (BW > 85 kg).

#### Left ventricular dysfunction after AMI:

Initial, 6.25 mg BID; titration, dose may be increase after 3-10 days to 12.5 mg BID, then again to target/Max dose of 25 mg BID.

Safety and efficacy not established in children 18 yr.

不良反應： 心跳過慢、低血壓、暈厥、眩暈、腹瀉、噁心、高血糖等。

交互作用： 1.與 reserpine、guanethidine、methyldopa、clonidine 或 guanfacine 等劑併用時，會加強其降壓及心跳減慢之效果。  
2.Rifampicin 會減少本劑之全身性可用率，因而減低本劑之降壓作用。  
3.使用本劑前數日，應逐量停止 clonidine 之使用。  
4.本劑與 nifedipine 並用會使血壓突然下降；與 verapamil、diltiazem 並用，則會導致血壓突然下降 及心跳緩慢之情形。  
5.本劑與 digoxin 併用，會增加 digoxin 之血中濃度，而使心跳減緩，並可能延誤心臟之刺激傳導。  
6.本劑有強化 insulin 及口服降血糖劑之效用。

注意事項： 1.心臟衰竭、呼吸道收縮疾病、心跳過慢、心臟搏動與傳導異常、休克、心肌梗塞併發症、嚴重肝功能不全、併服 MAOIs 製劑者禁用本劑。  
2.服用本劑可能使淚液分泌減少，配戴隱形眼鏡者須謹慎使用。  
3.使用 carvedilol 治療時不應突然停藥，尤其是在 CHF 病患。應逐漸停用 carvedilol (超過 2 週的間隔)。

懷 孕期： 1.不應在懷孕期間使用，除非治療效益大於潛在風險。  
2. When treatment of chronic hypertension in pregnancy is indicated, agents other than carvedilol are preferred (ACOG 203 2019).  
3. May be considered for use in pregnant patients with heart failure.

授 乳 期： 尚未知 carvedilol 是否會分泌至人類乳汁，故服藥期間不建議授乳。

儲 存： 保存於室溫(25°C 以下)陰涼、孩童無法取得之處；儲存於原包裝(對光敏感)內。