

Varenicline Tartrate

【OCHA5】 Champix[®] Film Coated Tablet 0.5mg/Tab, 11Tab/Box *ATC Code : N07BA03*

【OCHAN】 Champix[®] Film Coated Tablet 1mg/Tab, 14Tabs/Box *ATC Code : N07BA03*

中文名： 戒必適膜衣錠 «Pfizer»

適應症： 戒菸輔助劑。

藥理分類： Partial Nicotine Agonist; Smoking Cessation Aid.

用法用量： Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

Administration: orally, taken after eating and with a full glass of water.

Dosage regimen:

Adjunct in smoking cessation:

0.5 mg QD on days 1-3,

0.5 mg BID on days 4-7, and

1 mg BID from day 8 through the end of 12 weeks of treatment.

不良反應： 噁心、嘔吐、口乾、睡眠障礙、便秘、脹氣。

注意事項： 健康照護專業人員應觀察服用本藥者的行為或情緒變化（情緒低落、自殺意念、古怪或侵略性行為等反應）；服用本藥者若自覺行為或情緒有異，應與醫師聯絡；且於駕車或操作機械時應小心，直到明白該藥對自身的影響。
（美國FDA 2007/11/20 發布 Varenicline 初步研究報告建議事項）

懷 孕 期： 尚無任何適當且控制良好的對孕婦使用 Champix[®]的研究。在動物研究中，Champix[®]會導致胎兒體重減輕、聽覺驚嚇反應升高、以及子代生育力降低。只有在潛在效益超越胎兒可能面臨之風險的情況下才可於懷孕期間使用。

授 乳 期： 目前並不清楚 Champix[®]是否會分泌於人類乳汁中。動物研究顯示 varenicline 會分泌進入授乳動物的乳汁中。由於很多藥物會分泌至人類乳汁，而且考慮 Champix[®]對哺乳嬰兒造成嚴重不良反應的潛在可能性，因此應特別考慮此藥對母親的重要性，以決定要停止哺乳或是停用此藥。