

Chloral Hydrate

【OCHL】 Clodrin® Oral Solution 10% 100mg/mL 30mL/Bot

ATC Code : N05CC01

中文名：可律靜內服液劑 «晟德»

適應症：兒童檢查(non-painful procedure)前之鎮靜

藥理分類：Hypnotic, Miscellaneous.

用法用量：Administration: PO

Indications and dosage regimens:

Sedation, Anxiety:

— Adults: 250 mg Q8h.

— Children: 5-15 mg/kg/dose Q8h. MAX 500 mg/dose.

Hypnotic:

— Adults: 500-1000 mg HS or 30 minutes prior to procedure, not to exceed 2 g/24hr.

— Children: 20-40 mg/kg/dose up to a MAX 50 mg/kg/24hr or 1 g/dose or 2 g/24hr.

Prior to EEG:

— Children: 20-25 mg/kg/dose, 30-60 minutes prior to EEG; may repeat to MAX 100 mg/kg or 2 g total.

Sedative, nonpainful procedure: PO

— Children: 50-75 mg/kg/dose 30-60 min prior to procedure; may repeat 30 min after initial dose if need, to a total MAX 120 mg/kg.

仿單：

● 腦波檢查(EEG):

嬰兒(1個月至<1歲)及兒童:口服 25-50mg/kg。

總計最高劑量不超過 100mg/kg 且嬰兒不超過 1g，兒童不超過 2g。

● 無痛檢查處置前之鎮靜(處置前 30-60 分鐘投予):

嬰兒(1個月至<1歲):口服 30-50mg/kg。總計最高劑量不超過 100mg/kg 且嬰兒不超過 1g。

兒童:口服 50-60mg/kg，若有需要，30 分鐘後可額外給予 10-20mg/kg。總計最高劑量不超過 100mg/kg 且兒童不超過 2g。

不良反應：心律不整、睡眠形態改變、呼吸抑制、皮膚過敏。

交互作用：

● Warfarin：導致未結合血漿蛋白的 Warfarin 濃度短暫增加。

● 給予 Chloral hydrate 後靜脈注射 Furosemide 的患者中，由於置換甲狀腺激素與血漿蛋白的結合，引起代謝過高的狀態。其徵狀包含發汗、潮紅、血壓變化包含高血壓以及不安。

注意事項：

● 可能引起頭暈或嗜睡，開車或操作危險機械時須小心。

● 下列患者不建議使用：對 Chloral hydrate 或對其中任何賦形劑有過敏反應者、明顯肝或腎功能損害者、患有嚴重心臟疾病、嚴重胃炎、食道炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍、紫質症。

● 由於呼吸道阻塞的風險進而影響到生命安全，患有嚴重阻塞性睡眠呼吸中止症的兒童禁用。

● 應謹慎使用於精神抑鬱、有自殺傾向或酗酒或有藥物濫用史的患者。持續服藥 2 週，可能產生耐受性和心理依賴性。

● 應避免長期服用 Chloral hydrate 和突然停藥，以防止戒斷症狀的產生。

- Chloral hydrate 對皮膚和粘膜具有刺激性。藉由水或其他液體稀釋口服溶液可以減少胃部刺激。
- 使用於嬰兒時不建議重複給藥。使用於兒童時，依照用法用量之建議，至多額外給藥一次，並注意最大給藥劑量。

懷 孕 期： Animal reproduction studies have not been conducted. Chloral hydrate crosses the placenta, and long-term use may lead to withdrawal symptoms in the neonate.

授 乳 期： 1.Chloral hydrate is excreted in breast milk; use by breast-feeding women may cause sedation in the infant.
2.謹慎使用。

儲 存： 密封儲存於 25°C 以下，毋須冰存並避免陽光直射。開封後之保存期限為 30 天，儲存溫度為 25°C，未使用完應丟棄。

備 註： 本品項健保不給付。