

Clindamycin

【OCLEC】 Clindamycin® 300mg/Cap

ATC Code : J01FF01

中文名： 克林達黴素膠囊 «景德»

適應症： 鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等所引起之感染症。

藥理分類： Antibiotic, Lincosamide.

用法用量： **Administration:**

Capsule should be taken with a full glass of water to avoid esophageal irritation, may administer with or without meals.

General dosage:

— Adults:

Serious infections:

150-300 mg Q6H. (仿單)

More severe infections:

300-450 mg Q6H. (仿單)

600 mg Q6H. (*UpToDate*, 2022)

— Neonates $\leq$ 1 month of age:

15-20 mg/kg/day in 3 to 4 equal doses. The lower dosage may be adequate for small prematures.

— Children 1 month to 16 years of age:

8-25 mg/kg/day given in 3 or 4 equally divided doses. Children weighing $\leq$ 10 kg should receive a minimum dosage of 37.5 mg 3 times daily.

Mild or Moderate Hepatic/Renal Impairment:

Dosage adjustments not required.

不良反應： 胃腸障礙、潮紅、注射部位局部反應等。

注意事項：

1. 新生兒、早產兒須慎重使用。
2. 如出現輕微腹瀉、結腸炎情形時，只要停藥即可恢復。
3. Clindamycin Cap 應於 15-30°C 下避光儲存。

懷 孕 期： 臨床可用於預防或治療懷孕時的某些感染，如預防新生兒 *group B streptococcal* 感染、預防或治療 *Toxoplasma gondii encephalitis*、*Pneumocystis pneumonia (PCP)*。

授 乳 期： Clindamycin 會分泌至母乳中，接受治療期間應停止哺乳。