

CoAprovel

【OCA】 CoAprovel® Tablet

ATC Code : C09DA04

中文名：可普諾維膜衣錠 «Sanofi»

適應症：本態性高血壓。

成分：Each tab contains:

Irbesartan 150 mg

Hydrochlorothiazide 12.5 mg

藥理分類：Angiotensin II Receptor Blocker; Antihypertensive; Diuretic, Thiazide

用法用量：**Administration:** orally, administer with or without food.

Usual starting and maintenance dose:

1 tab QD; MAX: 2 tabs daily.

不良反應：噁心/嘔吐、頭暈、頭痛、疲倦、排尿異常、高尿酸。

交互作用：**Irbesartan--**

1. **ACEIs**: ↑ risk of adverse events (ie, hypotension, syncope, hyperkalemia, changes in renal function, acute renal failure).

2. **Entacapone**: ↑ exposure of Irbesartan.

3. **FUROSEMIDE**: may result in severe hypotension and deterioration in renal function, including renal failure.

4. **LITHIUM**: ↑ risk of lithium toxicity.

5. **TRIMETHOPRIM**: ↑ risk of hyperkalemia.

6. **POTASSIUM**: ↑ risk of hyperkalemia.

Hydrochlorothiazide—

1. **DIGITALIS GLYCOSIDES**: may result in digitalis toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).

2. **METHOTREXATE**: ↑ methotrexate exposure and enhanced myelosuppression.

3. **TOPIRAMATE**: ↑ topiramate exposure.

4. **NSAIDS**: ↓ diuretic effectiveness and possible nephrotoxicity.

注意事項：1. 飯前或飯後服用均可。

2. 若有經常咳嗽，應告知醫師。

3. 不建議使用於肝功能受損或嚴重腎功能受損（CCr<30 mL/min）之病患。

4. 對 sulfonamide 衍生物過敏者禁用本劑。

5. 痛風患者不建議使用。

懷 孕 期：1. 懷孕最初 3 個月內不建議使用血管收縮素 II 之受體拮抗劑。懷孕中期（第 4-6 個月）及後期（第 7-9 個月）則禁止使用血管收縮素 II 之受體拮抗劑。

2. 有報告指出，母體接受 thiazide 治療曾引發新生兒血小板減少症，或胎兒或新生兒黃疸。因此不建議於懷孕最初三個月內使用。

授 乳 期：1. 不建議用於授乳期間。

2. 目前還不清楚 irbesartan 是否會分泌至人類的乳汁中。Irbesartan 會分泌至授乳的大鼠乳汁中。高劑量 thiazides 會產生強烈利尿效果，會抑制母乳產生。