

Codeine Phosphate

【OCOD】 Codeine Phosphate® 30mg/Tab

ATC Code : R05DA04

中文名：磷酸可待因錠 «衛福部食藥署管制藥品製藥工廠»

適應症：鎮咳、鎮痛。

藥理分類：Analgesic, Opioid; Antitussive.

用法用量：Administration:

Administer with food or water to decrease nausea and GI upset.

Indications and dosage regimen :

Antitussive:

— Adult

7.5 ~ 120 mg/day as a single dose or in divided doses.

30 ~ 60 mg QID in specific patient populations (eg, lung cancer) (ACCP, 2017).

— Children:

Table. Usual Pediatric Antitussive Dosages

Age	Daily Dosage	Max. Dosage
2 yrs (ave. 12 kg)	3 mg Q4-6H	12 mg/day
3 yrs (ave. 14 kg)	3.5 mg Q4-6H	14 mg/day
4 yrs (ave. 16 kg)	4 mg Q4-6H	16 mg/day
5 yrs (ave. 18 kg)	4.5 mg Q4-6H	18 mg/day
6-11 yrs	5-10 mg Q4-6H	60 mg/day
12 yrs	10-20 mg Q4-6H	120 mg/day

衛生福利部公告修訂含 codeine 成分藥品的使用原則(2017.07.28)

『首先，含該成分處方藥品，除非無其他替代藥品且臨床效益大於風險時，醫師方可考慮處方使用於未滿 12 歲兒童，且應謹慎使用於 12 至 18 歲具呼吸功能不全的兒童。婦女於產後哺乳期間亦應禁止使用。』

Analgesic:

— Adults:

Initial: 15 to 60 mg Q4H PRN; maximum total daily dose: 360 mg/day.

— Children:

Children and Adolescents:

0.5 to 1 mg/kg/dose Q4~6H PRN; Maximum single dose: 60 mg/dose.

不良反應：1.呼吸抑制、不整脈、血壓變動、嗜眠、眩暈、視調節障礙、發汗、噁心、嘔吐、便秘、發疹、搔癢感、排尿障礙、顏面潮紅等現象。
2.戒斷症狀：呵欠、噴嚏、流淚、流汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、失眠、不安、譫妄、震顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等戒斷症狀。

交互作用：

- Azelastine (Nasal): ↑ the CNS depressant effect of codein.
- CYP3A4 Inhibitors (Strong) may increase serum concentrations of the active metabolite(s) of Codeine.
- CYP3A4 Inducers (Strong) may decrease serum concentrations of the active metabolite(s) of Codeine.
- MAOIs: ↑ the adverse/toxic effect of Codeine.

- 注意事項：
- 1.飯前或飯後服用均可。服藥期間勿飲酒。
 - 2.主要由肝臟代謝，基於嬰兒之肝臟系統尚未發育成熟，所以較易引起噁心、嘔吐與嗜睡等不良反應，**WHO 建議 codeine 成分製劑不建議使用於較年幼兒童。**
 - 3.長期使用者不可突然停藥，以免發生嚴重不良作用。
- 懷 孕 期：
1. 類似化合物(嗎啡)在動物試驗時有催畸性之報告，故於孕婦及可能已懷孕之婦人給藥時，應在療效與危險性間仔細評估。
 2. 分娩前給藥，產後新生兒會有多動、神經過敏、失眠、震顫等戒斷症狀。
- 授 乳 期：
- 1.禁止產婦於哺乳期間使用本品。產婦如需使用本品治療，應避免以用藥期間之母乳哺餵嬰兒。
 - 2.在正常治療劑量下，母乳中僅存在極低濃度之 codeine 與其活性代謝物，不太會對嬰兒產生不良反應，但屬 CYP2D6 超級快速藥物代謝之哺乳婦女，母乳中可能會存在高濃度之活性代謝物，可能對於受哺乳嬰兒產生鴉片中毒症狀，例如異常嗜睡、癱軟、餵養困難、呼吸困難，嚴重可能會致死。
- 儲 存：
- 備 註：
- 避光儲存。
- 未用完的本品如不再使用時，請繳(寄)回醫院銷燬處置。
- ※本品回收地點:A 棟 一樓門診藥局。