

Valsartan, Hydrochlorothiazide

【OCODI】Co-Diovan 80/12.5[®] Tablet

ATC Code : C09DA03

中文名： 可得安穩膜衣錠 80/12.5 «Novartis»

適應症： 單一療法無法控制的高血壓，做為第二線用藥。

成分： Each tab contains:

Valsartan 80 mg

Hydrochlorothiazide 12.5 mg

藥理分類： Angiotensin II Receptor Blocker; Antihypertensive; Diuretic, Thiazide.

用法用量： **Administration:** orally, taken with or without food. Do not chew or crush tablets.

Dosage regimen:

1 tablet once daily.

Maximum dose: Valsartan 320 mg/hydrochlorothiazide 25 mg per day.

不良反應： 頭痛、眩暈、疲倦、咳嗽、噁心/嘔吐等。

交互作用： **Valsartan--**

- **ACEIs:** ↑ risk of adverse events (ie, hypotension, syncope, hyperkalemia, changes in renal function, acute renal failure).
- **FUROSEMIDE:** may result in severe hypotension and deterioration in renal function, including renal failure.
- **LITHIUM:** ↑ risk of lithium toxicity.
- **TRIMETHOPRIM:** ↑ risk of hyperkalemia.
- **POTASSIUM:** ↑ risk of hyperkalemia.

Hydrochlorothiazide--

- **DIGITALIS GLYCOSIDES:** may result in digitalis toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).
- **METHOTREXATE:** ↑ methotrexate exposure and enhanced myelosuppression.
- **TOPIRAMATE:** ↑ topiramate exposure.
- **NSAIDS:** ↓ diuretic effectiveness and possible nephrotoxicity.

禁忌： 1. 懷孕。
2. 嚴重的肝功能不全、膽道性肝硬化及膽汁鬱積。無尿病患、嚴重腎功能不全 (CrCl <30 mL/min)。
3. 無法治療之低血鉀、低血鈉、高血鈣及有症狀之高尿酸血症。

注意事項： 1. 可空腹或與食物一起服用。
2. 合併使用鉀離子補充劑，保鉀利尿劑，含鉀離子的食鹽代用品，或其他可能提高鉀離子濃度的藥物 (如：肝素) 時需加以注意。
3. 本品不宜剝半、不可磨粉。

懷孕期： Co-Diovan 不應用於懷孕中之女性，若在治療期間檢查出已懷孕，應盡快中止使用 Co-Diovan。

授乳期： 不建議對哺乳中的母親使用 Co-Diovan。尚未知 valsartan 是否會分泌於乳汁中。Hydrochlorothiazide 則會通過胎盤並分泌於人類的乳汁中。