

Entacapone

【OCOMT】Comtan® 200mg/Tab

ATC Code : N04BX02

中文名：諾康停膜衣錠 «Novartis»

適應症：併用 Levodopa/Benserazide 或者 Levodopa/Carbidopa 兩類藥品治療帕金森氏症病人。

藥理分類：COMT Inhibitor, Anti-Parkinson Agent.

用法用量：**Administration:** orally, taken without regard to meals.

Dosage regimens:

Parkinson disease: Oral:

200 mg with each dose of levodopa/carbidopa, up to a maximum of 8 times daily (maximum daily dose: 1600 mg daily).

Note:

- To optimize therapy, the dosage of levodopa may need to be reduced or the dosing interval may need to be extended.
- Patients taking levodopa $\geq$ 800 mg daily or who had moderate-to-severe dyskinesias prior to therapy required an average decrease of 25% in the daily levodopa dose.

不良反應：失眠、運動困難、頭暈、口乾、腹瀉、疲倦。

交互作用：

- MAOIs(如 **LINEZOLID**): ↓ catecholamine metabolism and ↑ risk for hypertensive crisis.
- **WARFARIN**: ↑ warfarin exposure and risk of bleeding.
- Selected **CYP2C9 SUBSTRATES** (如 **GLIPIZIDE, LOSARTAN, IRBESARTAN, VORICONAZOLE**): ↑ exposure of CYP2C9 substrate.
- **GLIMEPIRIDE**: ↑ glimepiride exposure.
- **METOCLOPRAMIDE**: ↓ effectiveness of metoclopramide and Entacapone.
- **DOPAMINE, DOBUTAMINE, VENLAFAXINE, NOREPINEPHRINE**: ↑ risk of tachycardia, hypertension, and arrhythmias.

注意事項：

1. 空腹或與食物一起服用皆可。
2. 服藥期間避免喝酒。
3. 服藥後尿液可能變橘色或棕色。
4. 服藥期間，請勿開車或操作危險機械。

禁忌：

1. 肝功能不全者禁用。
2. 禁用於患有嗜鉻細胞瘤之病人，因可能增加高血壓危象性危險。
3. 曾經有過抗精神病藥惡性症候群（Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS）及/或非外傷性橫紋肌溶解症（non-traumatic rhabdomyolysis）者禁用。
4. Entacapone 禁止與無選擇性之單胺氧化酶（monoamine oxidase，MAO-A 及 MAO-B）抑制劑併用，如 phenylzine, tranylcypromine。
5. Entacapone 禁止與選擇性的 MAO-A 抑制劑加上一個選擇性的 MAO-B 抑制劑併用。

懷 孕 期：因尚無於懷孕婦女的使用經驗，故 entacapone 不推薦於懷孕期間使用。

授 乳 期：於動物研究中，entacapone 會自乳汁中分泌出，而 entacapone 於嬰兒的安全性未知，故婦女使用 entacapone 時，不應哺乳。