

Bisoprolol

【OCON】Concor® 5mg/Tab

ATC Code : C07AB07

中文名：康肯錠 «臺灣默克»

適應症：高血壓，狹心症，穩定型慢性中度至重度（NYHA class III、IV）心衰竭。

【OCON1】Concor® 1.25mg/Tab

ATC Code : C07AB07

中文名：康肯錠 «臺灣默克»

適應症：穩定型慢性中度至重度心衰竭。

藥理分類：Beta-Blocker, Beta-1 Selective; Antihypertensive.

用法用量：Safety and efficacy not established in children.

Administration: taken in the morning with or without food. They are swallowed with some liquid and not to be chewed.

Indications and dosage regimen:

Angina:

5-20 mg QD

Hypertension:

Initial, 2.5-5 mg QD;

maintenance, 2.5-20 mg QD;

MAX dose, 20 mg/day.

Congestive heart failure:

Initial, 1.25 mg QD; titrate to MAX dose of 10 mg QD.

Dosage titration:

1st week: 1.25mg QD

2nd week: 2.5mg QD

3rd week: 3.75mg QD

4th ~ 7th week: 5mg QD

8th ~ 11th week: 7.5mg QD

12th week~ and Maintenance: 10mg QD

不良反應：頭痛、眩暈、疲勞、睡眠不寧、脈搏緩慢、四肢冰冷等。

交互作用：● **Rivastigmine:** ↑ the bradycardic effect of Beta-Blockers. Avoid combination.

● **Dronedarone:** ↑ the bradycardic effect of Beta-Blockers. Dronedarone may ↑ the serum concentration of Beta-Blockers. Consider therapy modification.

注意事項：1. 空腹服用或與食物併服皆可。請伴服液體吞服，不要嚼碎。
2. 血糖起伏不定的糖尿病患、長期禁食者，以及酸中毒者應注意使用。
3. Clcr < 20 mL/min 或嚴重肝功能不全病患，每日用量勿超過 10 mg。
4. 長期治療後，勿任意改變服用劑量。並且不要突然中斷使用，如果需要中斷，原則上要逐漸遞減用量，分別每星期減少一半用量。
5. 病人開始 bisoprolol 1.25 毫克的治療後，應該接受大約 4 小時的觀察期（尤其應該注意血壓、心跳速率、傳導障礙、心臟衰竭的惡化徵兆）。

懷 孕 期：1. 因可能影響胎兒的發育，須評估利益及風險後才能使用。
2. Exposure to beta-blockers during pregnancy may increase the risk for adverse events in the neonate.
3. When treatment of chronic hypertension in pregnancy is indicated, agents other than bisoprolol are preferred.

授 乳 期：1. 不建議於授乳期使用本藥。
2. It is not known if bisoprolol is present in breast milk.
3. Caution be exercised when administering bisoprolol to breastfeeding women. Use of a beta-blocker other than bisoprolol may be preferred in a lactating female .