

Cortisone Acetate

【OCORT】 Cortisone(P.L.)® 25mg/Tab

ATC Code : H02AB10

中文名： 乙酸可體松片 «柏理»

適應症： 風濕性關節炎、急性風濕熱、過敏性病、炎症性眼病、皮膚病、贅生性疾病及阿迪生氏病。

藥理分類： Corticosteroid, Systemic.

用法用量： **Administration:** Take orally with food to reduce GI effects.

Indications and dosage regimens:

1. **類風濕性關節炎之劑量：**每 24 小時內給 100mg（即四片分成二至四次服用），連用二星期或至療效出現為止，然後逐漸減低劑量，每次減 5mg 或更多些，一直調節至最小合適之維持劑量，（最理想者為每日使用 50~75mg 或少於此量）。
2. **急性風濕熱之劑量：**第一天給 400mg 分成數次服用，以後每天 200mg 也分成數次服用，直至療效出現，即改用每天 50mg 或少於此量的維持劑量續服 6~8 星期。
3. **阿迪生氏病之劑量：**每日 10~25mg，佐以 4~9 克之氯化鈉，或 1~3mg 之 Desoxycorticosterone Acetate，以維持血內電解質之量而使病況進步。
4. 治療其他各病之劑量與類風濕性關節炎之用量相似，不過對於腎上腺性徵異常症之用量應視個別之需要不同而定，而喉頭水腫及嚴重哮喘須用大劑量（第一二天為 300 至 500mg），以後即用維持劑量或停藥，慢性哮喘患者須長期使用，療效顯著。

不良反應： 腸胃不適，情緒變化，食欲增加，水腫，肌肉痛，骨質疏鬆，毛髮增加等。

禁忌： 心臟儲存血量減少，充血性心臟衰竭，高血壓，精神病傾向，糖尿病，腎機能不足，久病健康不良、胃潰瘍，衰老、最近手術以後如腸吻合術。有活動性或可疑性癒合之結核病灶時，暫時不要應用本劑。

注意事項： 1.與食物一起服用或飯後立即服用。
2. 限制鈉鹽之攝取、矯正低鉀血症。
3. 需控制血糖過高。故高血壓、糖尿病患者服用應多加注意。

懷 孕 期： 1.Cortisone crosses the placenta (*Migeon 1957*).
2.Systemic corticosteroids may also influence fetal growth (decreased birth weight); however, information is conflicting (*Lunghi 2010*).
3. Cortisone may be used (alternative agent) to treat primary adrenal insufficiency (PAI) in pregnant women. Pregnant women with PAI should be monitored at least once each trimester (*Bornstein 2016*).

授 乳 期： 1.Corticosteroids are excreted in breast milk. The manufacturer notes that when used systemically, maternal use of corticosteroids have the potential to cause adverse events in a breastfeeding infant (eg, growth suppression, interference with endogenous corticosteroid production).
2.Breastfeeding is not recommended by the manufacturer in women taking pharmacologic doses.