

Pinaverium Bromide

【ODICE】Dicetel® 100 mg/Tab

ATC Code : A03AX04

中文名：得舒特膠囊 «亞培»

適應症：胃、十二指腸潰瘍、過敏性結腸、結腸炎、膽管運動困難。

藥性簡述：Blocks influx of calcium via voltage-sensitive channels within smooth muscle cells of the gastrointestinal tract resulting in a spasmolytic effect in the gut.

藥理分類：Calcium Channel Antagonist, Gastrointestinal.

用法用量：**Administration:** orally taken with meals or snacks.

- Do not crush or chew tablet.
- Should be taken with a glass of water with meals or snacks.
- The tablet should not be swallowed when in the lying position or just before bedtime.

Dosage regimen:

Initial: 50 mg TID; dose may be increased up to 100 mg TID (maximum dose: 300 mg/day).

不良反應：腹痛、噁心、嘔吐、吞嚥困難、皮膚疹、蕁麻疹、紅斑、過敏反應。

注意事項：

- 1.本品請勿口含或咀嚼。
- 2.請於**用餐時**以一大杯開水吞服，以避免食道粘膜接觸 pinaverium。
- 3.躺臥時或就寢前請**勿服用**得舒特膜衣錠。
- 4.使用前才將藥品於原鋁箔包裝中取。
- 5.病患先前患有食道損害和/或食管裂孔者，服用 Dicetel 時應特別注意正確的使用方法。
- 6.本藥含有乳糖成分。

懷 孕 期：

- 1.除非有明確必要，否則勿於懷孕期間使用本藥。無相關使用安全資料。
2. The presence of **bromine** in the formulation poses a theoretical risk of causing neurologic effects (sedation, hypotony) to newborns if pinaverium is used late in pregnancy, though no such cases have been reported.

授 乳 期：哺乳期間不可使用本藥。
Manufacturer advises against administration in breast-feeding women.

儲 存：貯存時請保持原始包裝，並將鋁箔片放置於外盒內，以避免光照。