

Cabergoline

【ODOST】Dostinex® 0.5mg/Tab

ATC Code : G02CB03

中文名：過乳降錠 «Pfizer»

適應症：防止及抑制產後乳汁分泌，或治療高泌乳素血症引起的狀況關節炎。

藥理分類：Ergot-derivative dopamine receptor agonist with a high affinity for D2 receptors.

用法用量：Administration: orally, taken with food (may increase tolerability).

Indications and dosage regimens:

Hyperprolactinemic disorders:

Initial: 0.5 mg once weekly or 0.25 mg twice weekly; the dose may be increased by 0.25 mg twice weekly up to a **maximum of 1 mg twice weekly** according to the patient's serum prolactin level.

Lactation suppression :

1 mg as a single dose during the first day after delivery.

Interrupt already established lactation :

0.25 mg q12h for 2 days.

Safety and efficacy not established in children < 16 yr.

不良反應：眩暈、頭暈、頭痛、便秘、憂鬱、噁心、疲倦、腹痛、姿勢性低血壓等。

交互作用：

- **SULPIRIDE, METOCLOPRAMIDE:** ↓ efficacy of either drug.
- **HALOPERIDOL:** loss of antiparkinson efficacy.
- **ITRACONAZOLE:** ↑ cabergoline exposure and an ↑ risk of cabergoline-related adverse effects.

注意事項：1. 建議與食物併服。

2. 開始服用的前幾天，開車、操作機械或執行其他事務時，應特別小心，以免發生危險。

懷 孕 期：在投予 Dostinex® 之前，應先確認患者並未懷孕。只有在確實適用且謹慎評估並權衡治療對患者的效益/風險後，才能讓孕婦使用 cabergoline。

授 乳 期：尚不知本品是否會分泌進入人類乳汁；不過，仍應囑咐母親，使用 cabergoline 後如果仍未能阻止或抑制乳汁分泌，也不要餵哺母乳。由於本品會抑制乳汁分泌，因此，對患有泌乳素過高症，但又想對嬰兒餵哺母乳的母親，不可投予 cabergoline。