

Venlafaxine

【OEAS】Easyfor® SR 37.5mg/Cap

ATC Code : N06AX16

中文名：悅康持續性藥效膠囊 «南光»

適應症：鬱症，泛焦慮症、社交焦慮症。

藥理分類：**Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitor**, Antidepressant.

用法用量：Administration:

- Oral: Administer with food.
- ER formulations: Administer either in the morning or in the evening at approximately the same time each day.
- Swallow capsule or tablet whole with fluid; do not divide, crush, chew, or place in water.
- Contents of capsule may be sprinkled on a spoonful of applesauce and swallowed immediately without chewing; followed with a glass of water to ensure complete swallowing of the pellets.

Dosage regimens:

Initially, 75 mg once daily with meal; may increase dosage by 75 mg/day increments every 4 days to a MAX dose of 225 mg/day.

不良反應：噁心、頭痛、嗜睡、口乾、便秘、暈眩、失眠、神經緊張、盜汗。

交互作用：併用 MAOIs 或 TCAs，易發生類精神病症狀的惡性症候群（體溫過高、肌陣攣...）。

注意事項：

1. 隨餐使用。每日早上或晚上之同一時間使用。用開水吞服整個膠囊，不得剝半，咬碎、咀嚼或放入水中，但可將膠囊小心打開，並將內容物(球狀體)倒在湯匙內與開水一起吞服。
2. 請配合醫師指示服用。
3. 小孩、青少年和年輕成人服用抗憂鬱劑需密切觀察。
4. 使用 Easyfor®治療時，可能會導致血壓持續性升高，因此要監測病人的血壓。
5. 本劑絕對禁止與 MAOIs 併用，須在 MAOIs 停用 2 週之後，才可使用。
6. 建議中度腎功能損壞的病患將全日劑量降低 25%，而中度肝功能損壞或血液透析的病患，將全日劑量降低 50%。
7. 回溯性臨床研究報導指出，相較於其他 SSRI 抗憂鬱藥品，venlafaxine 的用藥過量可能有較高的致死危險性，但其危險性仍比三環類抗憂鬱藥品來的低。建議醫療專業人員開立 venlafaxine 處方時，能一次給予病患最小量的膠囊數，並給予病患良好的教育與管理，來減低用藥過量的危險性。

懷孕 期：目前尚無足夠且控制良好的試驗。唯有當潛在效益勝過可能對胎兒造成的潛在風險時，才能在懷孕期間使用。

授乳 期：目前證明 venlafaxine 與 ODV(O-desmethylvenlafaxine)代謝物會分泌至乳汁。因可能對哺乳中的嬰兒有嚴重副作用的潛在性，故需針對母親用藥的重要性評估，而決定需要停止哺乳或停藥。

給付規定：全民健保藥品給付規定：使用時須符合衛生主管機關核准之適應症，病歷上應詳細註明診斷依據及使用理由。